

Sملزم بوصفة طبية
Prescription Only Medicine

N2013035866/374/1

PFOR VETERINARY USE ONLY
للإستعمال البيطري فقط

Reg. No. 7106

Composition:

Each 1 ml of suspension contains 150 mg Amoxicillin (as trihydrate).

Storage Conditions:

Store below 30°C, in a dry place away from sunlight.

Keep away from reach of children.

Withdrawal Time:

Meat: 30 days.

Eggs: 7 days.

Poultry: 5 days.

Milk: 7 days.

Recommended dosage:

Cattle, sheep and pigs: by intramuscular injection only.

Dogs and cats : by subcutaneous or intramuscular injection.

Dose: 0.25 ml/ 5 kg body weight.

If dose volume exceeds 20 ml in cattle or 10 ml in pigs, it should be divided and injected into two sites.

Special Precautions:

Use the injection within 28 days from the first dose, discard unused materials.

Shake well before use.

Amoxicare-Vet®

Injectable Suspension**Amoxicillin trihydrate****أموكسيكير - فيت®**

معلق معدّ للحقن

أموكسيسيلين ترايهايدريت

100ml

فرع النور:



شركة دار الشفاء

a division of Pharmacare PLC

بيتونيا - المنطقة الصناعية ص.ب. ٦٧٧ رام الله / فلسطين

التركيب الدوائي

كل ١ مل من المعلق يحتوي على ١٥٠ ملغم أموكسيسيلين (على شكل ترايهايدرات) .

ظروف التخزين

يحفظ الدواء في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية في مكان جاف وبعيدا عن الضوء .

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال .

فترة الأمانللحوم : يجب وقف العلاج قبل ٣٠ يوما من الذبح .
البيض : يجب وقف العلاج قبل ٧ أيام من الذبح .

الدواجن : ٥ أيام .

الحليب : ٧ أيام .

الجرعة الدوائيةالماشية، الأغنام والخنازير: حقنة في العضل فقط .
الكلاب والقطط حقنة تحت الجلد أو في العضل .

الجرعة : ٠,٢٥ مل / ٥ كغم من وزن الحيوان .

إذا زادت الجرعة عن ٢٠ مل في الماشية أو ١٠ مل في الخنازير، يجب أن تقسم وتحقن في موضعين .

تحذيرات خاصة

يجب استخدام الحقنة خلال ٢٨ يوم من أول جرعة، تخلص بعد ذلك من المادة المتبقية .

خض الزجاجاة جيدا قبل الإستعمال .

Batch No. :

Exp. :