



Doxicare-Vet® 10%

100 g

Water soluble powder

Composition: Each 1 g contains 100 mg Doxycycline Hcl.

Indication: Gastrointestinal and respiratory infections caused by doxycycline sensitive micro-organisms in Pre-ruminant calves, lambs, kids, poultry and swine.

Storage Conditions: 1- Store at temperature not exceeding 25 °C in a dry place away from light. 2- Keep away from reach of children.

Withdrawal time: For meat: Pre-ruminant calves, lambs & kids: 14 days. Swine: 8 days. Poultry: 7 days. For eggs: 21 days.

Recommended dosage: For oral administration through the drinking water.

Pre-ruminant calves, lambs & kids: 50 mg (of Doxicare-vet powder) / kg body weight twice daily during 3-5 days. **Swine & Poultry:** 1 g (of Doxicare-vet powder) / 1-2 liters of drinking water during 3-5 days.

Contraindications: - In animals with known hypersensitivity to Tetracycline.

- In Pregnant or Growing animals. - In animals with impaired renal and /or liver function. -In ruminants with an active microbial digestion. - Lactating animals.

- laying hens which produce eggs for human consumption.

Side effects: Diarrhea, vomiting, lack of appetite, allergic reaction, photosensitivity reaction and discoloration of teeth in young animals.

Drug interactions: Drugs or food that contain aluminum, calcium, zinc, magnesium, or iron, theophylline digoxin, penicillins, cephalosporins, aminoglycosides, quinolones, cycloserine, laxatives, kaolin, pectin and bismuth.

- Don't use after 28 days from opening.

- Don't use after 24 hours after dissolving in water.

التركيب النواصي: كل ١ غرام يحتوي على ١٠٠ ملغم دوكسيسايكلين هيدروكلوريد.

الفعالية العلاجية: أصابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي الناتجة عن الكائنات الحية الدقيقة الحساسة لدوكسيسايكلين في العجول الصغيرة والحمل والجدى والدواجن والخنازير.

شروط التخزين: ١- يحفظ الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز ٢٥ درجة مئوية في مكان جاف وبعيداً عن الضوء. ٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

فترة الأمان: للحم: العجول الصغيرة والحمل والجدى: ١٤ يوم. الخنازير: ٨ أيام. الدواجن: ٧ أيام. البيض: ٢١ يوم.

الجرعة النواصية: عن طريق الفم من خلال مياه الشرب.

العجول الصغيرة والحمل والجدى: ٥٠ ملغرام (من دوكسيكير - فبت بودرة) / كغم من وزن الجسم مرتان يومياً لمدة ٥-٣ أيام.

الخنازير والدواجن: ١ غرام (من دوكسيكير - فبت بودرة) / ١-٢ لتر من مياه الشرب لمدة ٥-٣ أيام.

موانع الاستخدام: - في الحيوانات المعروف أن لديها حساسية لتتيراسيكلينات. - في الحيوانات الحوامل أو الحيوانات في مرحلة النمو. - في الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي وألم كلبي. - في الحيوانات المجترّة ذات الهضم الميكروبي النشط.

- الحيوانات المرصعة. - اندجاج البيض الذي يستخدم بفضه للاستهلاك البشري.

الاعراض الجانبية: اسهال وتقيؤ وضعف الشهية تفاعلات الحساسية وتفاعلات حساسية الضوء وتلون الاسنان عند الحيوانات الصغيرة.

التداخلات الدوائية: الأدوية أو الطعام الذي يحتوي على النيوم أو كالسيوم أو زنك أو مغنسيوم أو حديد و الثيوفيلين والنجومكن والتيسيلينات والسفالوسبورينات والامينو غليكوسيدات والكولونونات والميكروسيرين والمثينات والكولين والبكتين والبيزميت.

- لا تستخدم الدواء بعد ٢٨ يوم من فتح العبوة.

- لا تستخدم الدواء بعد ٢٤ ساعة من حله بالماء.

دوكسيكير - فبت ١٠٪

بودرة للذوبان في الماء

للإستعمال البيطري فقط
FOR VETERINARY USE ONLY



بيتوليا - المنطقة الصناعية ص.ب. ٦٧٧ رام الله / فلسطين
Betunia- Industrial Zone P.O.Box 677 Ramallah / Palestine

Batch No. :
Exp. :
Reg. No. 7198

