

Batch No.:

Exp.:

بودرة للذوبان في الماء

Indication: Used in the treatment of gastrointestinal, respiratory and urinary tract infections caused by ampicillin susceptible bacteria.

Storage Conditions: 1-Store at temperature not exceeding 30 °C in a dry place away from sunlight. 2-Keep away from reach of children.

Withdrawal time: Meat (calves, pigs, kids and lambs):7 days.

Poultry (broilers):14 days.

Recommended dosage: For oral administration through the drinking water. 100 gm /500 liters of drinking water for 5-7 days.

Contraindications: In animals with known hypersensitivity to penicillin and cephalosporins.

- In small herbivores such as guinea pigs, hamsters and rabbits.

- In animals with renal dysfunction.

- In Ruminant animals.

- In poultry producing eggs for human consumption.

Side effects: 1- Hypersensitivity Reaction: urticaria, fever, angioedema, vasculitis, eosinophilia and anaphylaxis.

2- Severe disturbances of the intestinal bacterial flora of herbivores may occur.

Drug interactions: Aminoglycoside, Salicylate, Phenylbutazone, Sulfonamide, Probencid, Chloramphenicol, Erythromycin, Tetracycline.

- Don't use after 28 days after opening.

- Don't use after 24 hours after dissolving in water.

Reg. No.: 7145

N2013092944/402/1

أمبيكير - فيت ٥٠٪

Ampicare-Vet® 50%

Water Soluble Powder

Each 1g contains 500mg Ampicillin as Trihydrate.

كل ١ غرام يحتوي على ٥٠٠ ملغم أمبيسيلين على شكل ترايابايدرات

للاستعمال البيطري فقط

FOR VETERINARY USE ONLY



بيتونيا - المنطقة الصناعية ص.ب. ٦٧٧ رام الله / فلسطين
Betunia-Industrial zone- P.O.Box 677 Ramallah / Palestine

150 g

دواعي الاستخدام: يستخدم في علاج اصوات الجهاز الهضمي والتنفسى والمجاري البولية الناجمة عن البكتيريا الحساسة للبنسلينين.

ظروف التخزين: ١- يحفظ الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز ٣٠ درجة مئوية في مكان جاف و بعيداً عن ضوء الشمس. ٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

فتردة الأمان: لحوم (العجل والخنازير والجدي والحمل): ٧ أيام. الدواجن (اللحم): ١٤ يوم.
الجرعة الدوائية: عن طريق الفم من خلال مياه الشرب.
٥٠٠ غرام / ٥٠٠ لتر مياه الشرب لمدة ٥-٧ أيام.

موانع الاستخدام:

- في الحيوانات المعروفة أن لديها حساسية للبنسلينات والسفالوسيرينات.

- في الحيوانات الصغيرة العشبية مثل الخنازير الهندية والقوارض والأرانب.

- في الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي.

- في الحيوانات المجترة. - في الدجاج المنتج للبيض للاستهلاك البشري.

الاعراض الجانبية: ١- حساسية: الشرى ، الحمى، انفاس الاوعية، التهاب الاوعية الدموية، زيادة خلايا الایزوفيل، صدمة. ٢- ممكن أن تسبب اضطرابات شديدة في بكتيريا الأمعاء عند الحيوانات الصغيرة العشبية.

التدخلات الدوائية: الامينو غلوكوسيد، الساليسيلات، الفنيلبيتارون السلفوناميدات،

البروبونسيد، الكلور ميفينيكول، الأيترومايسن ، التيراسيابيكلينات.

- لا تستخدم الدواء بعد ٢٨ يوم من فتح العبوة.

- لا تستخدم الدواء بعد ٢٤ ساعة من حله بالماء.

P ملزم بوصفة طبية
Prescription Only Medicine

S