

Oxcline-Vet® 50% Water soluble powder

1000 g

أوكسكلاين® ٥٠٪ بودرة للذوبان في الماء

N2013112961/546/1

Composition: Each 1 gram contains 500 mg Oxytetracycline hydrochloride.

Indication: Treatment of infections caused by micro-organisms susceptible to tetracycline

Storage conditions: 1. Store below 25°C, in a dry place away from sunlight.

2. Keep away from reach of children.

Withdrawal time: Meat: 7 days. Eggs: 3 weeks.

Contraindications: -Animals which are hypersensitivity for Tetracycline, animal with serious renal and liver impairments, pregnancy animals and laying hens.

-Animals which have a Microbiological digestion in the gastro-intestinal system.

- Don't use after 28 days after opening.

- Don't use after 24 hours after dissolving in water.

Drug interactions: Penicillin, cephalosporins, quinolones, aminoglycosides, GI products containing (Aluminum, calcium, magnesium, bismuth), zinc, iron salts, oral sodium bicarbonate, kaolin and pectin.

Side effects: Discoloration of teeth in young animals, hypersensitivity reactions, GIT effects (diarrhea, vomiting) & Photodermatitis.

Recommended dosage: For oral administration.

Poultry & Swine: 1 g /2.5 liters of drinking water for 3-5 days.

Calves, goats & sheep: 40 mg /1-2 kg body weight twice daily for 3-5 days.

التركيب الدوائي: كل ١ غرام يحتوي على ٥٠٠ ملغم أوكسيتتراسايكلين هيدروكلورايد.

الفعالية العلاجية: لمعالجة الالتهابات الناجمة عن الجراثيم الحساسة للتتراسايكلين.

ظروف التخزين: يحفظ الدواء في درجة حرارة اقل من ٢٥ درجة مئوية، في مكان جاف وبعيدا عن ضوء الشمس. يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

فترة الأمان: اللحم: ٧ أيام. البيض: ٣ أسابيع.

موانع الاستخدام: الحيوانات التي لها حساسية للتتراسايكلين والحيوانات التي تعاني من ضعف في الكلى والكبد والحيوانات الحوامل والدجاج البياض. الحيوانات التي لديها طبيعة الهضم الميكروبيولوجي في الجهاز الهضمي.

- لا تستخدم الدواء بعد ٢٨ يوم من فتح العبوة.

- لا تستخدم الدواء بعد ٢٤ ساعة من حله بالماء.

التداخلات الدوائية: البنسلينات، السيفالوسبورينات والكوينولونات والأمينوغليكوزيدات والأمينوغليكوزيدات وأدوية الجهاز الهضمي التي تحتوي على (المنيوم، كالسيوم، مغنيسيوم، بزمث) والزنك وأملاح الحديد وبيكربونات الصوديوم الفموية والكاولين والبكتين.

الأعراض الجانبية: تلويح الأسنان في الحيوانات الصغيرة وتفاعلات الحساسية وتأثيرات الجهاز الهضمي (إسهال وقيء) والتهاب جلدي ضوئي.

الجرعة الدوائية: عن طريق الفم.

الدواجن والخنازير: ١ غرام / ٢,٥ لتر من مياه الشرب لمدة ٣-٥ أيام.

الابقار والماعز والاعنام: ٤٠ ملغرام / ١-٢ كغم من وزن الجسم مرتان يوميا لمدة ٣-٥ أيام.

Batch No. :

Exp. :

P ملزم بوصفة طبية
Prescription Only Medicine

S

للإستعمال البيطري فقط
FOR VETERINARY USE ONLY

Reg. No. 7150



فرع النور:

شركة دار الشفاء

a division of **Pharmacare PLC**

بيتونيا - المنطقة الصناعية ص.ب. ٦٧٧ رام الله / فلسطين
Betunia-Industrial zone- P.O.Box 677 Ramallah / Palestine