

Sulphanur 3 Forte®

Water soluble powder

Reg. No. : 7151

سلفانور ٣ فورت®

بودرة للذوبان في الماء

Composition : Each 1g contains 250 mg sulphadimidine Na, 250 mg sulphadiazine Na, 250 mg sulphathiazole Na.

Indication: Treatment of coccidia in poultry and large animals. Also in bacterial pneumonia, enteritis and bacterial diarrhea.

Storage conditions : 1. Store below 30°C, in a dry place away from sunlight. 2. Keep away from reach of children.

Special Precautions:

- Don't use after 28 days from opening.
- Don't use after 24 hours after dissolving in water.
- Don't use medicine for long time.
- Don't use medicine with antacid.
- Don't use medicine in younger broiler chicken.

Contraindications: - In the presence of renal disease or dehydration. - In animals with hypersensitivity to sulfonamides. - In layers.

Side effects: Polyarthrititis, urticaria, fever, hemolytic anemia, polyuria, hepatitis, anorexia, GI disturbances, ataxia, muscle weakness.

Withdrawal time: Meat: 10 days. Milk: 7 days.

Recommended dosage: Administered orally,

- Large Animals: 10-15 gm / 50 kg BW for 3-5 days.
- Poultry: 1.25 gm / Liter of drinking water daily for 3-5 days.

PHARMACARE PLC

Al-Nur division

Beitunia - Industrial zone
P.O.Box 677 Ramallah/Palestine

شركة دار الشفاء

فرع النور

بيتونيا - المنطقة الصناعية
ص.ب. ٦٧٧. رام الله / فلسطين

250 gm



Batch No.

Exp.

فرع النور:
شركة دار الشفاء
AL-NUR
a division of Pharmacare PLC

N2013115965/548/1

التركيب الدوائي : كل ١ غرام يحتوي على ٢٥٠ ملغم سلفادايدين صوديوم، ٢٥٠ ملغم سلفادايازين صوديوم، ٢٥٠ ملغم سلفاثيازول صوديوم. الفعالية العلاجية: العلاج من الكوكسيديا في الدواجن و الحيوانات الكبيرة. أيضا علاج الالتهاب الرئوي البكتيري والتهاب الأمعاء والإسهال البكتيري. ظروف التخزين: ١- يحفظ الدواء في درجة حرارة اقل من ٣٠ درجة مئوية، في مكان جاف وبعيدا عن ضوء الشمس. ٢- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. تحذيرات خاصة:

- لا تستخدم الدواء بعد ٢٨ يوم من فتح العبوة.
- لا تستخدم الدواء بعد ٢٤ ساعة من حله بالماء.
- ينصح بعدم استعمال الدواء لفترة طويلة.
- ينصح بعدم استعمال الدواء مع مضادات الحموضة.
- ينصح بعدم استعمال الدواء للأعمار الصغيرة من الدجاج اللاحم.
- موانع الاستخدام: - في حال وجود مرض كلوي أو الجفاف.
- للحيوانات المعروفة أن لديها حساسية من السلفوناميد. - للدجاج البياض.
- الأعراض الجانبية: التهاب المفاصل، الشرى، والحمى، وفقر الدم الانحلالي، بوال، و التهاب الكبد، فقدان الشهية، واضطرابات الجهاز الهضمي، وترنح، وضعف العضلات.
- فترة الأمان: - اللحوم: ١٠ أيام. - الحليب: ٧ أيام.
- الجرعة الدوائية: يؤخذ عن طريق الفم.
- الحيوانات الكبيرة: ١٠-١٥ غم / ٥٠ كغم من وزن الجسم لمدة ٣-٥ أيام.
- الدواجن: ١,٢٥ غم / لتر من مياه الشرب يوميا لمدة ٣-٥ أيام.

٢٥٠ غم

P ملزم بوصفة طبية S
Prescription Only Medicine

للإستعمال البيطري فقط

FOR VETERINARY USE ONLY