

Composition: Each 1 ml contains 100 mg Ciprofloxacin.

Indication:

Indicated in bacterial infections caused by micro-organisms susceptible to ciprofloxacin in pre-ruminant calves, lambs, kids, poultry and swine.

Storage conditions:

1. Store at temperature not exceeding 25 °C away from sunlight.
2. Keep away from reach of children.

Side effects:

Nausea, crystalluria, CNS effects (dizziness, stimulation) and rarely cause diarrhea and vomiting.

Contraindications:

- Animals with impaired hepatic or renal failure.
- Young animals due to cartilage injury.
- Hypersensitivity to ciprofloxacin or any other quinolones.

Drug interactions:

- nitrofurantion or agents containing minerals.
- theophylline, antacids, iron supplements, sucralfate, cyclosporine and various other antibiotics: (Aminoglycosides, third generation of cephalosporins, extended spectrum antibiotics, macrolids, and tetracyclines).

Withdrawal time: Meat: 12 days. Eggs: 7 days.

Recommended dosage:

For oral administration through the drinking water.

Poultry: 100 ml / 150-200 liters of drinking water for 3-5 day.

Pre-ruminant calves, lambs & kids: 10 ml / 75-150 kg body weight twice daily during 3-5 days.

Swine: 100 ml / 100-300 liters of drinking water for 3-5 day.

• Don't use after 28 days after opening.

• Don't use after 24 hours after dissolving in water.



للإستعمال البيطري فقط
FOR VETERINARY USE ONLY

Ciprocare-Vet® Oral solution 10 %

N2015085342/4671

500 ml

سيبروكير - فيت®
٪ ١٠ محلول للشرب عن طريق الفم

فرع النور:
شركة دار الشفاء
a division of Pharmacare PLC

بيتونيا - المنطقة الصناعية ص.ب. ٦٧٧، رام الله / فلسطين

التركيب الدوائي: كل 1 مل يحتوي على 100 ملجم من سيفروفلوكساسين.

الفعالية العلاجية: يستعمل لمعالجة الالتهابات الناجمة عن الجراثيم الحساسة للسيبروفلوکساسین فی العجول الصغيرة والحمل والجدي والدواجن والخنازير.

ظروف التخزين: 1 - يحفظ الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية بعيداً عن أشعة الشمس. 2 - يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

الأعراض الجانبية: الغثيان وبلورات في البول، تآثرات على الجهاز العصبي المركزي (الدوخة، والتحفيز)، ونادراً ما تسبب الإسهال والقيء.

موانع الاستخدام:
- الحيوانات التي تعاني من فشل كبدى أو كلوي.
- حسغار الحيوانات وذلك لأنها يسبب إصابة في الغضروف.
- فرط الحساسية للسيبروفلوکساسین أو أي كينولون آخر.

التدالخات الدوائية:
- النيتروفوريون أو مواد تحتوى على معادن.
- الثيو فيلين، مضادات المحموضة، مكممات الحديد، سكر لفيت، سايكلوسبورين،

ومضادات حيوية أخرى: (الأمينو غلوكوزيد، الجول الثالث من السيفالوسبورينات، والمضادات الحيوية واسعة الاستعمال، الماكروليدات والتتراسكليلات).

فترة الأمان: اللحوم: 12 يوم. البيض: 7 أيام.
الجرعة الدوائية: يؤخذ عن طريق الفم من خلال مياه الشرب.

الدواجن: 100 - 150 مل / 100 - 200 لتر من مياه الشرب لمدة 5-3 أيام.
العجل الصغيرة والحمل والجدي: 10 مل / 100-75 كغم من وزن الجسم مرتان يومياً لمدة 5-3 أيام.

الخنازير: 100 - 1000 مل / 1000 - 3000 لتر من مياه الشرب لمدة 5-3 أيام.
- لا تستخدم الدواء بعد 28 يوم من فتح العبوة.

- لا تستخدم الدواء بعد 24 ساعة من حلته بالماء.



6251595 501128

Batch No.: Exp.:

Reg. No.: 7208