



N2013035856/2741

Mfg.:

Exp.:

Batch No.:

Reg. No.: 7116

**Composition:** Each 1 ml contains: 100 mg Flumequine  
**Indication:** Indicated in the treatment of infections caused by microorganisms susceptible to Flumequine.

**Storage Conditions:** 1. Store at temperature not exceeding 30 °C.  
2. Keep away from reach of children. 3. Keep away from sunlight.

**Contraindication:**

- Don't use this drug if your pets are pregnant or breast-feeding.
- It should be used cautiously if your pets have significant renal or hepatic impairment.
- Should not give to laying hens.
- Should not be used in sheep producing milk for human consumption.
- Should not be used for large ruminants.

**Special Precautions:**

Excessive use of quinolones should be avoided in immature animals, because high-prolonged dosages in growing dogs have produced cartilaginous erosions leading to permanent lameness.

Don't use after 28 days after opening.

Don't use after 24 hours after dissolving in water.

**Side effect:** Vomiting, diarrhea, hemolytic anemia.

**Interactions:** Antacids, nitrofurantoin, multivitamin compound, divalent and trivalent cations (iron, Al, Mg, Ca, Zn).

**Withdrawal time:** Meats: 8 days. Chickens: 3 days. Eggs: 5 days.

**Recommended dosage:** As directed by the veterinarian.

Usual doses are: Treatment should be continued for at least 3 to 5 days.

Dogs and Cats: 15 mg (0.15 ml)/kg body weight PO once daily.

Rabbits: 15-30 mg (0.15-0.3 ml)/kg body weights.

Small ruminants (calves, lambs and kids): 12mg (0.12 ml)/kg body weight PO once daily. Birds: 12 mg (0.12 ml)/kg body weight (2 ml/4 liter, drinking water).

Foals: 12 mg (0.12 ml)/kg body weight.

**P** ملازم بوصفة طبية  
Prescription Only Medicine

**S**

للإستعمال البيطري فقط

FOR VETERINARY USE ONLY

PHARMACARE PLC  
Al-Nur division  
Belurina - Industrial zone  
PO Box 677 Ramallah/Palestine

شركة دار الشفاء  
فروع النور  
بيروتيا - المنطقة الصناعية  
ص.ب. ٦٧٧ رام الله / فلسطين

# Emiquine®

## Oral Solution

500 ml



AI-NUR  
a division of

شركة دار الشفاء

Pharmacare PLC

فروع النور:

## أيميكوين® محلول للشرب عن طريق الفم

**التركيب الدوائي:** كل ١ مل يحتوي على ١٠٠ ملغم فلو ميكوين.

**الفعالية العلاجية:** يستخدم لعلاج الالتهابات الناجمة عن الجراثيم الحساسة للفلو ميكوين.

**ظروف التخزين:** ١- يحفظ الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز ٣٠ درجة مئوية.

٢- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. ٣- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس.

**موانع الاستخدام:** - لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا كان الحيوان حاملا أو مرضعا.

- يجب استعمال هذا الدواء بحذر عند الحيوانات التي تعاني من خلل في وظيفة الكبد أو الكلية.

- لا يعطى للدجاج البيض. - لا يستعمل للحيوانات المنتجة للحليب للاستهلاك البشري.

- لا يستعمل للمجترات الكبيرة.

**تحذيرات خاصة:** • الاستعمال طويل الأمد للكينولون يجب تجنبه عند الحيوانات الصغيرة وذلك لأنه

يؤدي العضاريف ويؤدي هذا إلى الشلل أو العرج الدائم. • لا تستخدم الدواء بعد ٢٨ يوم من فتح

العبوة. • لا تستخدم الدواء بعد ٢٤ ساعة من حله بالماء.

**الأعراض الجانبية:** القيء والإسهال وفقر الدم الانحلالي.

**التداخلات الدوائية:** مضادات الحموضة نيتر و فيور انتونين ومركبات الفيتامينات و الكاتيونات ثنائية

التكافؤ وثلاثية التكافؤ (الحديد، الألمنيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم والزنك).

**فترة الأمان:** اللحوم: ٨ أيام. الدجاج: ٣ أيام. البيض: ٥ أيام.

**الجرعة الدوائية:** يجب ان يتم العلاج لمدة ٣ - ٥ ايام على الاقل.

- الكلاب والقطط: ١٥ ملغم (٠,١٥ مل)/كغم من وزن الجسم عن طريق الفم مرة واحدة يوميا.

- الارانب: ١٥ - ٣٠ ملغم (٠,١٥-٠,٣ مل)/كغم عن طريق الفم.

- الحيوانات الصغيرة (المواشي الصغيرة بشكل عام): ١٢ ملغم (٠,١٢ مل)/كغم من وزن الجسم

عن طريق الفم مرة واحدة يوميا.

- الطيور: ١٢ ملغم (٠,١٢ مل)/كغم من وزن الجسم (٢ مل / ٤ لتر) من ماء الشرب.

- الخيول الصغيرة: ١٢ ملغم (٠,١٢ مل)/كغم من وزن الجسم.