

**Composition:** Each 1 ml contains 40 mg Trimethoprim and 200 mg Sulphadiazine sodium.

**Indication:** Is indicated in the treatment of systemic infections caused by or associated with microorganisms sensitive to the Trimethoprim and Sulfadiazine.

**Storage conditions:** 1. Store below 30°C, in a dry place away from sunlight.  
2. Keep away from reach of children.

**Don't use after 28 days after opening.**

**It's important that all treated animals receive adequate water intake.**

**Contraindications:** Animals with known hypersensitivity to active ingredients, Animals with liver or renal disease or blood dyscrasias, Horses and Pregnant animals and new born animals.

**Side effects:** Dry eye ,liver inflammation, vomiting, lack of appetite, diarrhea, fever, facial swelling, arthritis blood disorders, crystalluria, polydipsia and polyurea. **Withdrawal time:** Milk: 7 days. Meat: 18 days.

**Drug interactions:** Antacids, Digoxin, Cyclosporine, Thiazide diuretics, Hypoglycemic agents, Methotrexate, Warfarin, Calcium preparation, Salicylates and Phenylbutazone.

**Recommended dosage:** Cattle and pigs:1ml/16kg body weight once by intramuscular or slow intravenous injection.

Dogs and Cats:1ml / 8 kg body weight by subcutaneous injection only. But in severe infections it may be repeated daily until 2 days after symptoms resolve up to a maximum of 5 days.

**PHARMACARE PLC**

Al-Nur division

Betunia - Industrial zone  
P.O.Box 677 Ramallah/Palestine

**شركة دار الشفاء**

فرع التور  
بيتونيا - المنطقة الصناعية  
ص.ب. ٦٧٧ - رام الله / فلسطين



فرع التور:

شركة دار الشفاء



100 ml

# BactiNur®

## Injectable Solution

N2015025250/566/1

للاستعمال البيطري فقط

**التركيب الدوائي:** كل 1 مل يحتوي على ٤٠ ملغم ترايميثوبيريم و ٢٠٠ ملغم سالفاديزين صوديوم.

**الفعالية العلاجية:** يستخدم في علاج الاصابات الجهازية الناجمة عن أو المرتبطة بالكلاثنات الدقيقة الحساسة للميثوبيريم و السلفاديزين.

**ظروف التخزين:** ١. يحفظ الدواء في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية، في مكان جاف و بعيداً عن ضوء الشمس. ٢. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

**لا تستخدم الدواء بعد ٢٨ يوم من فتح العبوة.** من المهم لكل الحيوانات المعالجة أن تتلقى كمية كافية من المياه.

**موانع الاستخدام:** الحيوانات المعروفة أن لديها حساسية للمواد الفعالة و الحيوانات المصابة بمرض الكبد أو الكلي أو اضطرابات الدم والخيول و الحيوانات الحوامل و الحيوانات حديثة الولادة.

**الأعراض الجانبية:** جفاف العين، والتهاب الكبد، والقيء، وفقدان الشهية، والإسهال، والحمى، تورم في الوجه والتهاب المفاصل، امراض الدم ، بيلة البليورات ، العطاش وتكرار التبول.

**فترة الأمان:** الحليب: ٧ أيام. اللحوم: ١٨ أيام.

**التدخلات الدوائية:** مضادات الحموضة، الدجوكتسين، السيكلوسبورين، مدرات البول الثيازيدية، العوامل المخفضة لسكر الدم، الميثوتريكسات، الوارفارين، مستحضرات الكالسيوم، الساليسيلات و الفنيلبنزويت.

**الجرعة الدوائية: الماشية والخنازير:** ١مل / ١٦ كغم وزن الجسم مرة واحدة عن طريق العضل أو الوريد بشكل بطيء. **الكلاب والقطط:** ١مل / ٨ كغم وزن الجسم تحت الجلد فقط.

ولكن في الاصابات الخطيرة يمكن تكرار ذلك يومياً لمدة يومين بعد زوال الأعراض لحد أقصى ٥ أيام.

Reg. No.: 7184

Batch No.:

Exp.: