

Composition :

Each 1 ml contain 100 mg Enrofloxacin.

Indication :

Indicated in the treatment of infections caused by micro-organisms susceptible to Enrofloxacin.

Storage conditions :

1. Store at temperature not exceeding 30 °C away from sunlight. 2. Keep away from reach of children.

Withdrawal time: Poultry (meat): 8 days.

Pigs (meat): 28 days. Eggs: do not use in layers.

Special precautions:

- Do not use with other drugs.
- Don't use after 28 days after opening.
- Don't use after 24 hours after dissolving in water.

Recommended dosage:

For oral administration through the drinking water.

- Poultry: 1 liter / 2000 liters of drinking water for 3-5 days, equivalent to 10 mg enrofloxacin per kg body weight.
- Pigs: 1 ml / 40 kg body weight, equivalent to 2.5 mg enrofloxacin per kg body weight.

PHARMACARE PLC

Al-Nur division

Beitunia - Industrial zone

P.O.Box 677 Ramallah/Palestine

شركة دار الشفاء

فرع النور

بيتونيا - المنطقة الصناعية

ص.ب. ٦٧٧ رام الله / فلسطين

ENROCARE-Vet[®]

10% Solution

Oral Solution

Enrofloxacin

محلول للشرب عن طريق الفم

انروكسيفلوكساثين
محلول ١٠٪[®]

انروفلوكساسين

100 ml



a division of

Pharmacare PLC

التركيب الدوائي :

كل ١ مل يحتوي على ١٠٠ ملغم من انروفلوكساسين.

الفعالية العلاجية:

لمعالجة الإصابات الناجمة عن الجراثيم الحساسة

للانروفلوكساسين.

ظروف التخزين:

١. يحفظ الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز ٣٠ درجة مئوية

بعيدا عن اشعة الشمس. ٢. يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

فترة الأمان: الدواجن (لحوم): ٨ أيام. الخنازير (لحوم): ٢٨

يوم. البيض: لا يستخدم للدواجن البياضة.

تحذيرات خاصة:

١. لا تستخدم المستحضر مع أدوية أخرى.

٢. لا تستخدم الدواء بعد ٢٨ يوم من فتح العبوة.

٣. لا تستخدم الدواء بعد ٢٤ ساعة من حله بالماء.

الجرعة الدوائية:

يؤخذ عن طريق الفم من خلال مياه الشرب.

- الدواجن: ليتر واحد / ٢٠٠٠ ليتر من مياه الشرب لمدة ٣-٥

أيام، بما يكافئ ١٠ ملغم انروفلوكساسين / ١ كغم من وزن

الجسم.

- الخنازير: ١ مل / ٤٠ كغم من وزن الجسم، بما يكافئ ٢,٥

ملغم انروفلوكساسين / ١ كغم من وزن الجسم.

لاستعمال البشري فقط

FOR VETERINARY USE ONLY



Lot.
Exp.