

Patient Package Insert  
**Prescription Only Medicine**  
Carefully read the following insert before starting use  
**MUCOCARE® ELIXIR AND TABLETS**

**COMPOSITION:**

Mucocare Elixir: Each 5 ml contains 4 mg Bromhexine HCl.

Mucocare Tablets: Each tablet contains 8 mg Bromhexine HCl.

**THERAPEUTIC ACTIVITY:** Mucolytic agent.

**APPROVED INDICATIONS:** Mucocare is indicated as a mucolytic agent and as an aid for expectoration.

**WHEN SHOULD THE PREPARATION NOT BE USED?**

Do not use this medicine if you are sensitive to the active ingredient.

**DO NOT TAKE THIS MEDICINE WITHOUT CONSULTING A PHYSICIAN:** If you are pregnant or breastfeeding. If you are suffering or have suffered from impaired function of the digestive system (e. g. ulcer).

**WARNING:** Do not use this medicine frequently or for a long period, without consulting a physician. If you are allergic to any type of food or medicine, inform your physician before starting the treatment with this medicine.

**DRUG INTERACTIONS:** If you are taking any additional drugs or if you have just finished a course with another medicine inform the attending physician, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions such as: Amoxicillin, Cefuroxime, Erythromycine, Doxycycline.

**SIDE EFFECTS:** In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the period of taking this medicine. Symptoms that may occur are nausea, dizziness, and skin rash. If any side effects not mentioned in this leaflet are experienced or if there has been any change in the general health, consult your physician.

**RECOMMENDED DOSAGE:** Dosage is according to physician's instructions only. This medicine is to be taken when needed only at specific time intervals as determined by the physician. Do not exceed the recommended dosage.

**DIRECTIONS FOR USE:**

1. **Mucocare Elixir:** Take the medicine with or without food. Take care to measure the dose using the plastic measuring spoon inside the box.

2. **Mucocare Tablets:** Do not chew or divide the tablet. Tablets should be swallowed whole with a small amount of water, and taken with or without food.

**MISSED DOSE:** If you missed a dose, take it as soon as you remember, then continue to take it at the usual times, and never take a double dose to compensate the missed one. If you have missed several doses, please inform your doctor. Do not exceed the recommended dosage.

**OVERDOSE:** This medicine contains substances, which can be poisonous or fatal in large doses to children and/or infants, therefore must be kept out of their reach. In case of accidental overdose, or if a child take the medicine by accident, seek professional assistance or rush to a hospital emergency room accompanied with the medicine's package. Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor!

**HOW CAN YOU CONTRIBUTE TO THE SUCCESS OF THE TREATMENT?** Complete the full course of treatment as instructed by the physician. Even if there is an improvement in your health do not discontinue using this medicine, before consulting your physician.

**AVOID POISONING:** This medicine has been prescribed for the treatment of your illness; it may harm other patients. Do not give this medicine to your relatives, neighbors, etc. Do not take medicine in the dark! Check the label and the dose each time you take your medicine.

**STORAGE:** Store at temperature not exceeding 25°C. Even if kept in their original container and stored as recommended, medicine may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt consult the pharmacist who dispensed the medicine to you. Keep out of reach of children.

**PRESENTATION:**

Mucocare Elixir: A carton box of amber glass bottle of 100 ml with plastic measuring spoon 2.5 ml and 5 ml.

Mucocare tablets: Box of 20 tablets.



نشرة للمريض  
ملزم بوصفة طبية  
يجب قراءة النشرة جيدا قبل البدء بالاستعمال  
ميوكوير® سائل وحبوب

#### التركيب الدوائي:

ميوكوير® سائل: يحتوي كل ٥ مل على ٤ ملغم بروموهكسين هيدروكلورايد.

ميوكوير® حبوب: تحتوي كل حبة على ٨ ملغم بروموهكسين هيدروكلورايد.

الفعالية العلاجية: طارد للبلغم.

دواعي الاستعمال: يستعمل ميوكوير كمخفف للزوجة البلغم ويساعد في طرده.

متى لا يجوز استعمال هذا الدواء؟

للمرضى المعروف أن لديهم حساسية للمادة الفعالة.

لا يجوز استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب: في حالة الحمل أو الرضاعة. للمرضى الذين يعانون في الوقت الحالي أو مسبقا من خلل في الجهاز الهضمي (مثل القرحة).

التحذيرات: يجب تجنب العلاج الطويل الأمد والمستمر دون استشارة الطبيب. يجب إبلاغ الطبيب قبل استعمال هذا الدواء إن تواجدت حالات الحساسية لدواء معين أو طعام ما.

التداخلات الدوائية: إذا كنت تتناول دواء إضافيا أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر فيجب إبلاغ الطبيب المعالج لتفادي الأضرار أو عدم نجاح الدواء الناجمة عن تفاعلات مع عقاقير أخرى مثل: الاموكسيسيلين، السيفروكسيم، الايثرومايسين، الدوكسيسايكلين.

الأعراض الجانبية: بالإضافة إلى التأثير الطبي للدواء فان لكل دواء تأثيرات وأعراض جانبية غير مرغوب فيها قد تحدث أثناء تناول هذا الدواء. مثال ذلك: الغثيان، الدوخة والطفح الجلدي. على المريض إبلاغ الطبيب في حال الشعور بأي أعراض جانبية أخرى غير واردة في النشرة أو بأي تغيرات على الصحة العامة.

الجرعة الدوائية: الجرعة حسب إرشادات الطبيب فقط. يجب تناول هذا الدواء في فترات معينة كما حددها الطبيب. يجب عدم تجاوز الجرعة المحددة.

#### إرشادات الاستعمال:

١. ميوكوير سائل: تناول هذا الدواء مع أو بعد الأكل. احرص على قياس الجرعة باستخدام الملعقة البلاستيكية المرفقة بالعبوة.

٢. ميوكوير حبوب: لا تمضغ أو تقسم الحبة. ابلع الحبة كاملة مع كمية كافية من الماء. يؤخذ الدواء مع أو بدون طعام.

الجرعة المنسية: إذا نسيت تناول جرعة دوائية، تناول الدواء حال تذكرك ذلك، ومن ثم تابع تناولك للدواء في الوقت المعتاد، ولا يجب ابدا تناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية. إذا نسيت تناول عدة جرعات دوائية، الرجاء إعلام طبيبك المعالج. يجب عدم تجاوز الجرعة المحددة.

الجرعة الزائدة: هذا الدواء قد يحتوي على مواد سامة أو قاتلة عند تناولها بجرعات عالية عند الأطفال أو الرضع لذلك يجب حفظ الأدوية في مكان بعيد عن متناول أيديهم وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. في حال تناول جرعة زائدة بالخطأ أو إذا قام طفل بتناول هذا الدواء بالخطأ يجب التوجه إلى المستشفى قسم الطوارئ و اصطحاب عبوة الدواء. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

كيف يمكنك المساهمة في إنجاح العلاج: إكمال دورة العلاج كاملة كما هو مقرر من قبل الطبيب. عدم التوقف عن تناول العلاج دون استشارة الطبيب حتى لو طرأ تحسن على الصحة العامة.

لتجنب التسمم: هذا الدواء وصف لعلاج مرضك أنت لذا فقد يسبب الضرر لمريض آخر. لا تعطي هذا الدواء لجارك أو قريبك أو أي شخص آخر. لا يجوز تناول هذا الدواء في الظلام. يجب التأكد من الدواء و الجرعة قبل كل مرة لتناولك الدواء.

التخزين: يجب حفظ الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز ٢٥ درجة مئوية. لا تبقى الأدوية صالحة لفترات طويلة حتى لو بقيت الأدوية في عبوتها الأصلية وتم حفظها بموجب الإرشادات، تبقى الأدوية صالحة للاستعمال لفترات محدودة. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية الدواء! في حالة الشك يجب استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء. ابق الدواء بعيدا عن متناول الأطفال.

#### الشكل الصيدلاني:

ميوكوير® سائل: عبوة تحتوي على عبوة زجاجية غامقة اللون سعة ١٠٠ مل سعة مع ملعقة بلاستيكية قياسها ٢,٥ مل و ٥ مل.

ميوكوير® حبوب: عبوة تحتوي على ٢٠ حبة.

شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

ص.ب. ٦٧٧- بيتونيا- المنطقة الصناعية- رام الله - فلسطين

