

الأعراض الجانبية:
في والبيلة السكرية وارتفاع السكر في الدم والإسهال والعطاش والتبول بالإضافة إلى أعراض كوشينغ، زيادة إفراز الغدة القشرية الكظرية، نهام، احتباس السوائل والصوديوم، نقص بوتاسيوم الدم، وتأخر التئام الجروح، وتقرح المعدة والأمعاء، تضخم الكبد، تكلسات جلدية، وانخفاض إنتاج الحليب، وتبطيط المناعة وهشاشة العظام، نقص إفراز الغدة الدرقية والتهاب الصفيحة عند الخيول.

فترة الأمان:
الابقار والخراف والخنازير والماعز: ٢١ يوم. الحليب: ٧٢ ساعة.

الجرعة الدوائية وطريقة الاستعمال:
الأحصنة والخنازير: ٥-٢,٥ ملغم (٦٢٥-٠,٦٢٥ مل) ببطء عن

طريق الوريد فقط.
الكلاب والقطط: ٠-٠,٢٥ - ١ ملغم (٠,٦٢٥-٠,٢٥ مل) ببطء عن

طريق الوريد فقط.
الابقار والخراف والماعز: ٢٠-٥ ملغم (١,٢٥-٥ مل) عن طريق

الوريد ببطء والعضل.
Reg. No. 7127

P
Prescription Only Medicine

S

للإستعمال البيطري فقط
FOR VETERINARY USE ONLY

Dexacare-Vet® 0.4%

Injectable Solution

دِيَكَسَّاَكِيرَ-فِيتَ ٤٠٠٪

محلول معد للحقن

50 ml

Each 1 ml contains 4 mg Dexamethasone Sodium phosphate

N2013035846/3301

فرع النور:
شركة دار الشفاء
a division of **Pharmacare PLC**
بيتونيا - المنطقة الصناعية ص.ب. ٦٧٧ رام الله / فلسطين

التركيب الدوائي: كل ١ مل يحتوي على ٤ ملغم ديكساميثازون
صوديوم فوسفات
 الفعالية العلاجية: يستخدم كمضاد للالتهابات وكمعامل
جلوكوكورتيكoid مثل التهاب المفاصل الحاد.
 ظروف التخزين: ١- يحفظ الدواء في درجة حرارة أقل من ٣٠
درجة مئوية، في مكان جاف وبعيداً عن الضوء.
٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
لا تستخدم الدواء بعد ٢٨ يوم من فتح العبوة.
 موائع الاستخدام:
الحيوانات الحوامل والمرضعات ، الفشل الكلوي، اختلال
وظيفي في الكبد، داء السكري، والاصابات الفطرية الجهازية
والعدوى الفيروسية ، وفشل القلب الاحتقاني، وهشاشة العظام
والسل.

التداخلات الدوائية:
مضادات الالتهابات الغير ستيرويدية والسيكلوسبورينات،
والمضادات الحيوانية من نوع ماكرولايد واللقاحات،
الباربيتورات، والأدوية المضادة للفطريات ومدرات البول
المستترفة للبوتاسيوم.

Batch No.:
Exp.: