

Patient Package Insert
Prescription Only Medicine
Carefully read the entire leaflet before starting use
BETACARE® CREAM

COMPOSITION: Betamethasone 17-valerate equivalent to 0.1% Betamethasone base.

THERAPEUTIC ACTIVITY: Topical corticosteroidal drug.

APPROVED INDICATIONS: Betacare cream is indicated for the relief of inflammatory and pruritic manifestation of the skin responsive to corticosteroid therapy such as eczema, psoriasis, and contact sensitivity reactions.

WHEN SHOULD THE PREPARATION NOT BE USED?

In patients with known hypersensitivity to the active ingredient.

DO NOT USE THIS MEDICINE WITHOUT CONSULTING A PHYSICIAN: If you are pregnant or breastfeeding.

WARNINGS: Do not use this medicine frequently, or for long period without consulting a physician. If you are allergic to any type of food or medicine, inform your physician before starting treatment with this medicine.

DRUG INTERACTIONS: If you are taking any additional drugs or if you have just finished a course with another medicine, inform the attending physician, in order to prevent adverse reactions or lack of efficacy arising from drug interactions.

SIDE EFFECTS: In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course of using this medicine. Symptoms such as burning, itching, and irritation may occur. If any side effects not mentioned in this leaflet are experienced or if there has been any change in the general health, consult your physician.

RECOMMENDED DOSAGE: Apply to the affected area 1-3 times daily or according to physician's instructions. Do not exceed the recommended dosage.

DIRECTIONS FOR USE: Apply a thin film to the affected area using a small quantity. Do not swallow. This medicine is intended for external use only.

HOW CAN YOU CONTRIBUTE TO THE SUCCESS OF THE TREATMENT? Complete the full course of treatment as instructed by the physician. Even if there is an improvement in your health, do not discontinue using this medicine, before consulting your physician.

AVOID POISONING: This medicine contains substances, which can be poisonous or fatal in large doses to children and/or infants, therefore must be kept out of their reach. In case of accidental overdose or if a child uses this medicine by accident, seek professional assistance or contact a hospital emergency room accompanied with the medicine's package. This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment; it may harm other patients. *Do not give this medicine to your relatives, neighbours, etc.* Do not use medicine in the dark! Check the label and the dose each time you use your medicine.

STORAGE: Store at temperature not exceeding 25°C. Don't refrigerate. Even if kept in their original container and stored as suggested; medicine may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt consult the pharmacist who dispensed the medicine to you.

REGISTRATION NUMBER: 007/546/15

PRESENTATION: Tube of 15 g.

Pharmacare - PLC

P.O. Box 677 – Beitunia- Industrial Zone-Ramallah-Palestine



L-2011022448/346/1

نشرة للمريض
ملزم بوصفة طبية
يجب قراءة النشرة جيدا قبل البدء بالاستعمال
بيتاكير® كريم

التركيب الدوائي: بيتاميثازون ١٧- فاليرات ما يعادل ٠,١ % بيتاميثازون القاعدة.
الفعالية العلاجية: كورتيكوستيرويد لمعالجة الالتهابات الجلدية.
دواعي الاستعمال: لمعالجة الالتهابات والحكة الجلدية التي تستجيب للعلاج بالكورتيكوستيرويد مثل اكزيما،
الصدفية، وردود فعل حساسية التلامس.
متى لا يجوز استعمال هذا الدواء؟

للمرضى المعروف أن لديهم حساسية للمادة الفعالة.

لا يجوز استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب: في حالة الحمل أو الرضاعة.
التحذيرات: تجنب العلاج الطويل الأمد و المستمر دون استشارة الطبيب. يجب إبلاغ الطبيب قبل استعمال هذا
الدواء إن تواجدت حالات الحساسية لدواء معين او طعام ما.
التداخلات الدوائية: اذا كنت تتناول في الوقت ذاته او قبل فترة وجيزة لدواء آخر يجب إبلاغ الطبيب المعالج
لتفادي الأخطار او عدم نجاح الدواء الناجمة عن تفاعلات مع عقاقير أخرى.
الأعراض الجانبية: بالإضافة الى التأثير الطبي للدواء فان لكل دواء تأثيرات وأعراض جانبية غير مرغوب فيها
قد تحدث أثناء استعمال هذا الدواء. مثال ذلك: الحرقه، الحكة، أو التهيج. على المريض إبلاغ الطبيب في حال
الشعور بأي أعراض جانبية أخرى غير وارده في النشرة او بأي تغييرات على الصحة العامة.
الجرعة الدوائية: تدهين المنطقة المصابة ١-٣ مرات يوميا. الجرعة حسب إرشادات الطبيب. يجب أن لا تتجاوز
الجرعة المحددة من قبل الطبيب.
إرشادات الاستعمال: تدهين المنطقة المصابة بطبقة رقيقة مستعملا كمية قليلة. لا يؤخذ عن طريق الفم.
للاستعمال الخارجي فقط.

كيف يمكنك المساهمة في إنجاح العلاج: إكمال دورة العلاج كاملا كما هو مقرر من قبل الطبيب. عدم التوقف عن
استعمال العلاج دون استشارة الطبيب حتى لو طرأ تحسن على الصحة العامة.
لتجنب التسمم: يجب حفظ الأدوية في مكان بعيد عن استعمال الأطفال او الرضع وذلك لتفادي أصابتهم بالتسمم.
في حال استعمال جرعة زائدة او إذا قام طفل باستعمال هذا الدواء بالخطأ يجب التوجه الى الطوارئ و اصطحاب
علبة الدواء. هذا الدواء وصف لعلاج مرضك أنت لذا فقد يسبب الضرر لمريض آخر. لا تعطي هذا الدواء لجارك
او قريبك او أي شخص آخر. لا يجوز استعمال هذا الدواء في الظلام. يجب التأكد من الدواء و الجرعة قبل
الاستعمال.

التخزين: يجب حفظ الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز ٢٥ درجة مئوية. لا يحفظ في الثلاجة. لا تبقى الأدوية
صالحة لفترات طويلة حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب الإرشادات. الرجاء ملاحظة تاريخ
انتهاء صلاحية المستحضر. في حالة الشك يجب استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء.

التعبئة: أنبوب يحتوي على ١٥ غرام

رقم التسجيل: ٠٠٧/٥٤٦/١٥



شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية
ص.ب. ٦٧٧ - بيتونيا - المنطقة الصناعية - رام الله - فلسطين