

N2013075924/194/1

**Composition:** Each 1 ml contains 10 mg ivermectin.

**Indication:** Broad-spectrum parasiticide used to treat and control gastrointestinal roundworms, lungworms, eye worms, sucking lice, mites and ticks.

**Storage conditions:** 1. Store below 30°C, in a dry place away from light. 2. Keep away from reach of children.

**Contraindication:**

- Animals with known hypersensitivity to active ingredient.
- Pregnant and lactating animals.
- Veal calves.
- Other species as dogs.
- Cattle or sheep producing milk for human consumption.
- Within 60 days prior to calving.

**Side effects:** Abnormally fast heart rate, nausea, flushing, lightheadedness, fever, rashes, muscle pains, joint aches, eye irritation, diarrhea, depression, coma and death.

**Drug interactions:**

With barbiturates, benzodiazepines, and valproic acid.

**Withdrawal time:** Cattle meat: 49 days. Sheep meat: 37 days. Swine meat: 28 days.

**Recommended dosage:**

For subcutaneous administration only.

- Cattle and sheep: 1 ml /50 kg body weight given once.
- Swine: 1 ml/33 kg body weight given once.

# IVONUR

Injectable solution 1%

## ايفونور®

محلول معد للحقن 1%

50 ml



a division of

Pharmacare PLC

بيتونيا - المنطقة الصناعية ص.ب. 677 رام الله / فلسطين

Betunia-Industrial zone- P.O.Box 677 Ramallah / Palestine

التركيب الدوائي: كل 1 مل يحتوي على 10 ملغم افرمكتين.  
الفعالية العلاجية: قاتل للطفيليات واسع الطيف يستخدم لعلاج ومكافحة الديدان المعوية المعوية المستديرة والديدان الرئوية وديدان العين والقمل الماص والعث والقراد.

ظروف التخزين: 1- يحفظ الدواء في درجة حرارة اقل من 30 درجة مئوية، في مكان جاف وبعيدا عن الضوء. 2- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.  
موانع الاستخدام:

- الحيوانات المعروفة ان لديها حساسية للمادة الفعالة.
  - الحيوانات الحوامل والمرضعة.
  - العجول اللاحمة.
  - الانواع الاخرى مثل الكلاب.
  - الابقار او الاغنام المنتجة للحليب للاستهلاك البشري.
  - خلال فترة 60 يوم قبل الولادة في الابقار والاعنام.
- الأعراض الجانبية:

تسارع في نبضات القلب، وغثيان و احمرار و دوام وحمى وطفح جلدي وآلام في العضلات وآلام في المفاصل و تهيج العين وإسهال و اكتئاب و غيبوبة و الموت.  
التداخلات الدوائية: مع الباربيتورات والبنزوديازيبينات وحمض فالبرويك.  
فترة الأمان: لحوم الأبقار: 49 يوم. لحوم الاغنام: 37 يوم. لحوم الخنازير: 28 يوم.  
الجرعة الدوائية: للجرعة تحت الجلد فقط.  
الابقار والاعنام: 1 مل / 50 كغم من وزن الجسم تعطى مرة واحدة.  
الخنزير: 1 مل / 33 كغم من وزن الجسم تعطى مرة واحدة.

Batch No.:

Exp.:

Reg. No.: 7141

P ملزم بوصفة طبية  
Prescription Only Medicine

S For veterinary use only  
لإستعمال بيطري فقط