

Tylonur Powder®

Water soluble powder

تيلونور بودرة®

بودرة للذوبان في الماء

الأعراض الجانبية:

تفاعلات الحساسية مثل ورم في الغشاء المخاطي في المستقيم وتورم في الشرج واسهال في الخنازير.

التدخلات الدوائية:

مع اللينكوساميد والبنسلينات والسيفالوسبورينات والمакروليدات، والكوندولونات والسيكلوسيرين.

فترة الأمان: اللحوم: 5 أيام.

الجرعة الدوائية:

يؤخذ عن طريق الفم من خلال مياه الشرب: في البداية حضر محلول أولي عن طريق اضافة 2 لتر من الماء الفاتر تحت التحريك المستمر الى وعاء فيه 100 غرام من المستحضر (وليس العكس) واضف هذا محلول لتحضير المحلول النهائي بتراكيز صحيحة.

الدواجن: 1 كغم / 1500 - 2000 لتر من مياه الشرب خلال 5-3 أيام متتالية.

الخنازير: 1 كغم / 3000 - 4000 لتر من مياه الشرب خلال 7-5 أيام متتالية.

العجل والجدي والحمل: 5 غرام / 220 - 250 كغم من وزن الجسم مرتين يومياً خلال 7-5 أيام.

التركيب الدوائي:

كل 1 غرام من البودرة يحتوي على 1000 ملغم تيلوسين تارترات.

الفعالية العلاجية:

الوقاية والعلاج من الاصابات التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للتيلوسين، مثل اصابات الميكوبلازم (أمراض الجهاز التنفسى المزمنة) واصابات المعدة والأمعاء و التهاب الغشاء المفصلي المعدى واصابات الجهاز التنفسى في العجول، الجدي، الحمل، الخنازير، الدواجن والحمام.

ظروف التخزين:

1- يحفظ الدواء في درجة حرارة اقل من 30 درجة مئوية، في مكان جاف وبعيداً عن ضوء الشمس.

2- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

3- لا تستخدم الدواء بعد 28 يوم من فتح العبوة.

4- لا تستخدم الدواء بعد 24 ساعة من حله بالماء.

موانع الاستخدام:

الحيوانات المعروفة ان لديها حساسية للمادة الفعالة.

الدجاج البياض والخيول والأرانب والحيوانات المجترة.

500 g

N2013025826/496/1

Composition: Each gram powder contains 1000 mg Tylosin Tartrate.

Indication: Prevention and treatment of infections caused by microorganisms susceptible to Tylosin, like in Mycoplasma infections (C.R.D.), gastrointestinal infections, Infectious Synovitis and pneumonia infections in calves, kids, lambs, pigs, poultry, and pigeons.

Storage conditions:

1. Store below 30°C, in a dry place away from sunlight.

2. Keep away from reach of children.

- **Don't use after 28 days after opening.**

- **Don't use after 24 hours after dissolving in water.**

Contraindication:

- Animals with known hypersensitivity to active ingredient.
- Laying hens, horses, rabbits and Ruminants.

Side effects: Hypersensitivity reactions

like edema of the rectal mucosa, anal swellings and diarrhea in pigs.

Drug interactions: With lincosamides, Penicillin, cephalosporines, macrolides, quinolones, and cycloserine.

Withdrawal time: For meat: 5 days.

Recommended dosage: Administered orally via the drinking water.

First make a pre-solution by adding 2 liters of tapped water under continuous stirring to a container with 100 gram of product (not vice versa) and add this solution to prepare the final solution in the correct concentration.

- Poultry: 1 kg / 1500-2000 liters of drinking water during 3 - 5 consecutive days.
- Swine: 1 kg / 3000 - 4000 liters of drinking water during 5-7 consecutive days.
- Calves, kids and lambs: 5 gm/ 220-250 kg body weight twice daily for 5-7days.

P ملزم بوصفة طبية
Prescription Only Medicine

S

Reg. No. : 7138

للإستعمال البيطري فقط
FOR VETERINARY USE ONLY



فرع النور:

شركة دار الشفاء

a division of **Pharmacare PLC**

بيتونيا - المنطقة الصناعية ص.ب. ٦٧٧ رام الله / فلسطين

Beitunia - Industrial zone P.O.Box 677 Ramallah/Palestine 6



Batch No. :

Exp. :

251595 510113