

Patient Package Insert
Prescription Only Medicine
Carefully read the entire leaflet before starting use
Glimaryl® 1, 2, 3, 4 mg Tablets

COMPOSITION: Each tablet contains 1, 2, 3, 4 mg of Glimepiride.

THERAPEUTIC ACTIVITY: Oral hypoglycemic agent.

APPROVED INDICATIONS: It is indicated for the treatment of non-Insulin dependent diabetes mellitus (TYPE II).

WHEN SHOULD THE PREPARATION NOT BE USED?

- Do not use this medicine if you are sensitive to the active ingredient, or to any other component of the drug, or to other sulfonyl urea, or to sulfonamides.
- Do not use this medicine if you have diabetes type 1 or ketoacidosis with or without coma.
- If you are pregnant or breastfeeding.

DO NOT TAKE THIS MEDICINE WITHOUT CONSULTING A PHYSICIAN: If you are suffering or have suffered in the past from impaired function of the heart, kidney, liver and / or vascular system. If you suffer from malnutrition, pituitary and adrenal insufficiency.

WARNINGS: If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your doctor before commencing treatment with this medicine. Blood and urine glucose, should be monitored periodically. Do not drink alcohol while taking glimaryl.

A correct diet, regular & sufficient physical exercise & decrease body weight are important to achieve optimal control of blood sugar.

Note: This medicine contains sodium (Na).

DRUG INTERACTIONS: If you are taking any additional drugs or if you have just finished a course with another medicine, inform the attending physician, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions, especially with medicines belonging to the following: Non-steroid anti-inflammatory drugs, salicylates medications, sulfonamides, chloramphenicol, coumarins, probenecid, Monoamineoxidase inhibitors, thiazides, thyroids products, corticosteroids, propranolol, oral miconazole and oral contraceptives.

SIDE EFFECTS: In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course of taking this medicine such as: hypoglycemia, gastrointestinal reactions, allergic skin reactions, blurred vision, headache, nausea, ravenous hunger, lassitude, sleepiness, dizziness, shallow respiration or bradycardia.

In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there a change in your general health, consult your doctor immediately.

RECOMMENDED DOSAGE: Dosage is according to physician's instructions only . Do not exceed the recommended dosage. This medicine is to be taken at specific time intervals as determined by the physician. If you forget to take this medicine at the specified time, take the dose as soon as you remember, but never take a double dose.

DIRECTIONS FOR USE: Do not chew! Swallow the medicine with a small amount of water, with breakfast or the first main meal.

MISSED DOSE: If you missed a dose, take it as soon as you remember, then continue to take it at the usual times, and never take a double dose to compensate the missed one. If you have missed several doses, please inform your doctor. Do not exceed the recommended dosage.

OVERDOSE: This medicine contains substances, which can be poisonous or fatal in large doses to children and/or infants, therefore must be kept out of their reach. In case of accidental overdose, or if a child take the medicine by accident, seek professional assistance or rush to a hospital emergency room accompanied with the medicine's package.

HOW CAN YOU CONTRIBUTE TO THE SUCCESS OF THE TREATMENT? Complete the full course of treatment as instructed by the physician. Even if there is an improvement in your health do not discontinue using this medicine before consulting your physician.

AVOID POISONING: This medicine has been prescribed for the treatment of your illness; it may harm other patients. Do not give this medicine to your relatives, neighbors, etc. Do not take medicine in the dark! Check the label and the dose each time you take your medicine.

STORAGE: Store below 25°C. Even if kept in their original container and stored as recommended, medicine may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt consult the pharmacist who dispensed the medicine to you.

PRESENTATION: Box of 30 tablets.

REGISTRATION NUMBER:

Glimaryl® 1 mg tablets: 007/413/30

Glimaryl® 2 mg tablets: 007/414/30

Glimaryl® 3 mg tablets: 007/415/30

Glimaryl® 4 mg tablets: 007/416/30

Pharmacare PLC
Beitunia- Industrial Zone
P.O. Box 677 - Ramallah, Palestine



L2012012677/2852/8

نشرة المريض
ملزم بوصفة طبية
يجب قراءة النشرة جيدا قبل البدء بالاستعمال
جليماريل® ١، ٢، ٣، ٤ ملغم حبوب

التركيب الدوائي: كل حبة تحتوي على ١، ٢، ٣، ٤ ملغم جليمبيراييد.

الفعالية العلاجية: خافض للسكر في الدم.

دواعي الاستعمال: لمعالجة مرض السكري من النوع غير المعتمد على الأنسولين (نوع ٢).

متى لا يجوز استعمال هذا الدواء؟

- لا يجوز استعمال هذا الدواء عند المرضى المعروف أن لديهم حساسية للمادة الفعالة، أو لأحد مركبات هذا الدواء، أو لأحد مركبات السلفونيل يوريا، أو للسلفوناميد.

- لا يجوز استعمال هذا الدواء لمرضى السكري نوع ١ أو في حالات كيتواسيدوسيس مع أو بدون وجود سيات.

- لا يجوز استعمال هذا الدواء في حالة الحمل أو الرضاعة.

لا يجوز استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب: للمرضى الذين يعانون في الوقت الحالي أو مسبقا من أمراض في القلب، الكلى، الكبد أو الشرايين. إذا كنت تعاني من سوء التغذية، أو قصور في الغدة النخامية و الكظرية.

تحذيرات: يجب إبلاغ الطبيب قبل استعمال هذا الدواء إن تواجدت حالات الحساسية لدواء معين أو طعام ما. يجب مراقبة كمية السكر في الدم والبول بشكل دوري. يجب الامتناع عن شرب الخمر والمشروبات الروحية أثناء العلاج بهذا الدواء.

الحمية الغذائية الصحيحة والمنظمة، بالإضافة إلى التمارين الرياضية الكافية، وتخفيف الوزن هي عوامل ضرورية للمحافظة على المستوى الطبيعي للسكر في الدم.

ملاحظة: يحتوي هذا الدواء على الصوديوم.

التفاعلات بين الأدوية: إذا كنت تتناول عدة أدوية في نفس الوقت، أو إذا أنهيت العلاج قبل فترة وجيزة من بدء تناولك لهذا الدواء، اعلم طبيبك المعالج أو الصيدلاني وذلك لمنع التفاعلات الجانبية أو عدم النجاعة الناجمة عن التفاعلات ما بين الأدوية، وهذا مهم خاصة مع الأدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية: أدوية الالتهابات الغير ستيرويدية، أدوية الساليسيلات، السلفوناميد، كلورامفينيكول، كومارين، بروبنسيد، معيقات المونومينوأكسيداز، الثيازيد، أدوية الغدة الدرقية، الكورتيكوستيرويد، البروبرانولول، أدوية الميكونازول التي تؤخذ عن طريق الفم وموانع الحمل.

الأعراض الجانبية: بالإضافة إلى التأثير الطبي للدواء فإن لكل دواء تأثيرات وأعراض جانبية غير مرغوب فيها قد تحدث أثناء تناول هذا الدواء مثل: انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم، آلام معدية - معوية، أعراض حساسية جلدية، تشوش الرؤية، وصداع، غثيان، الجوع الشديد، الكسل، النعاس، الدوخة، ضيق في التنفس أو تباطؤ ضربات القلب.

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام نتيجة لاستعمالك لهذا الدواء، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالا.

الجرعة الدوائية: الجرعة حسب إرشادات الطبيب. يجب اخذ هذا الدواء في فترات معينة كما حددها الطبيب. في حال نسيان تناول الدواء في الوقت المناسب يجب على المريض تناول الدواء في أقرب وقت ممكن. يجب عدم تجاوز الجرعة المحددة أو تناول جرعة مضاعفة.

إرشادات الاستعمال: هذا الدواء ليس للمضغ! يبلع الدواء مع القليل من الماء مع وجبة الإفطار أو الوجبة الأولى الرئيسية.

الجرعة المنسية: إذا نسيت تناول جرعة دوائية، تناول الدواء حال تذكرك ذلك، ومن ثم تابع تناولك للدواء في الوقت المعتاد، ولا يجب ابدأ تناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية. إذا نسيت تناول عدة جرعات دوائية، الرجاء إعلام طبيبك المعالج. **يجب عدم تجاوز الجرعة المحددة.**

الجرعة الزائدة: في حال تناول جرعة زائدة أو إذا قام طفل بتناول هذا الدواء بالخطأ يجب التوجه إلى الطوارئ و اصطحاب علبة الدواء. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

كيف يمكنك المساهمة في نجاح العلاج: إكمال دورة العلاج كاملا كما هو مقرر من قبل الطبيب. عدم التوقف عن تناول العلاج دون استشارة الطبيب حتى لو طرأ تحسن على الصحة.

لتجنب التسمم: هذا الدواء وصف لعلاج مرضك أنت لذا فقد يسبب الضرر لمرضى آخر. لا تعطي هذا الدواء لجارك أو قريبك أو أي شخص آخر. لا يجوز تناول هذا الدواء في الظلام. يجب التأكد من الدواء و الجرعة قبل كل مرة لتناولك الدواء.

التخزين: يجب حفظ الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز ٢٥ درجة مئوية. لا تبقى الأدوية صالحة لفترات طويلة حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب الإرشادات. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر. في حالة الشك يجب استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء.

استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء.

الشكل الصيدلاني: علبة تحتوي على ٣٠ حبة.

رقم التسجيل:

جليماريل® ١ ملغم حبوب: ٣٠/٤١٣/٠٠٧

جليماريل® ٢ ملغم حبوب: ٣٠/٤١٤/٠٠٧

جليماريل® ٣ ملغم حبوب: ٣٠/٤١٥/٠٠٧

جليماريل® ٤ ملغم حبوب: ٣٠/٤١٦/٠٠٧



شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

بيتونيا - المنطقة الصناعية- ص.ب. ٦٧٧- رام الله - فلسطين

٢٠١٢٠١٢٦٧٧/٢٨٥٢/٨ ل