

Neonur-vet® 20%

Powder soluble in water

250 g



فرع النور:

شركة دار الشفاء

Pharmacare PLC

نيونور-فيت® ٢٠٪

بودرة للذوبان في الماء

Composition: Each 1 g of powder contains 200 mg of Neomycin sulfate.

Indications: Treatment of gastrointestinal infections caused by for neomycin sensitive bacteria.

Storage Conditions:

1. Store at temperature not exceeding 25°C away from sunlight. 2. Keep away from reach of children.

Special Precautions: - You should use this product within 24 hours after dissolving the powder in water.

- If there is no improvement after 3 days of treatment, the diagnosis should be reconsidered.

Contraindications: - In animals with known hypersensitivity to the active ingredient.

- In the presence of intestinal obstruction.

- Should not be used in pregnant animals.

- In renal failure cases.

- In animals producing milk for human consumption.

- In hens producing eggs for human consumption.

- Animals with an active microbiological digestion (Ruminants).

Side effects: Diarrhea, nephrotoxicity, deafness, respiratory paralysis, cardiovascular depression, neuromuscular blockade.

Drug interactions: Oral penicillin VK, digoxin, vitamin K, methotrexate, other aminoglycosides, furosemide and cephalosporin.

Withdrawal time: Meat: (Swine, calves): 21 days. Poultry: 7 days.

Recommended dosage: For oral administration.

- Calves, sheep and goats: 10 gram / 200 kg body weight for 3-5 days.

- Swine: 1 kg / 2000 liters drinking-water for 3 - 5 days.

- Poultry: 1 kg / 2000 liters drinking-water for 3 - 5 days.

المكونات: كل ١ غرام من البودرة يحتوي على ٢٠٠ ملغم نيوميسن سلفيت.

الفعالية العلاجية:

علاج إصابات الجهاز الهضمي التي تسببها البكتيريا الحساسة للنيوميسين.

ظروف التخزين: ١- يحفظ الدواء في درجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية بعيداً

عن أشعة الشمس. ٢- يحفظ الدواء بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

تحذيرات خاصة:

- يجب استعمال الدواء خلال ٢٤ ساعة من تذويب البودرة بالماء.

- إذا لم يكن هناك أي تحسن بعد ٣ أيام من العلاج يجب إعادة النظر بالتشخيص.

موانع الاستخدام:

- للحيوانات المعروفة أن لديها حساسية للمادة الفعالة.

- عند وجود إنسداد معوي.

- للحيوانات في فترة الحمل.

- للحيوانات المنتجة للحليب للاستهلاك البشري.

- للدجاج المنتج للبيض للاستهلاك البشري.

- لا يعطى للحيوانات التي تعاني من الفشل الكلوي.

- للحيوانات ذات الهضم الميكروبي النشط، (المجترّة).

الأعراض الجانبية: إسهال وسمية كلوية وصمم وشلل الجهاز التنفسي وانخفاض

في عمل القلب والأوعية الدموية وحصار عصبي عضلي.

التداخلات الدوائية:

البنسيلين VK الديجوكسين وفيتامين K وميثوتريكسيت و الأمينو غليكوزيدات

الأخرى، فوروسيميد وسيفالوسبورين.

-فترة الأمان: -للحوم (العجول والخنازير): ٢١ يوم. -الدواجن: ٧ أيام.

الجرعة الدوائية: للجرعة عن طريق الفم.

-العجول والأغنام والماعز: ١٠ غم / ٢٠٠ كغم من وزن الجسم لمدة ٣-٥ أيام.

-الخنازير: ١ كغم / ٢٠٠٠ لتر مياه شرب لمدة ٣-٥ أيام.

-الدواجن: ١ كغم / ٢٠٠٠ لتر مياه شرب لمدة ٣-٥ أيام.

AL-Nur a division of:

PHARMACARE PLC

AL-Nur division

Beltunia - Industrial zone

P.O.Box 677 Ramallah/Palestine

شركة دار الشفاء


فرع النور

بيتونيا - المنطقة الصناعية

ص.ب. ٦٧٧ رام الله / فلسطين

P ملزم بوصفة طبية S Prescription Only Medicine

FOR VETERINARY USE ONLY



Batch No.:

Exp.:

Reg. No.: 7114