

Patient Package Insert
Prescription Only Medicine
Carefully read the entire leaflet before starting use
CIPROCARE® 250, 500, 750 TABLETS

COMPOSITION: Each tablet contains 250, 500, and 750 mg ciprofloxacin (as monohydrate HCl).

THERAPEUTIC ACTIVITY: Broad-spectrum Antibiotic.

APPROVED INDICATIONS: Ciprocure is indicated for the treatment of infections caused by micro-organisms susceptible to ciprofloxacin.

WHEN SHOULD THE PREPARATION NOT BE USED?

In patients with known hypersensitivity to the active ingredient.

DO NOT TAKE THIS MEDICINE WITHOUT CONSULTING A PHYSICIAN: If you are pregnant or breastfeeding. If you are suffering or have suffered from impaired function of the nervous system, the liver, or the kidney. Not intended for use in children or adolescents under the age of 18.

WARNINGS: Do not take this medicine frequently, or for a long period without consulting a physician. If you are allergic to any type of food or medicine, inform your physician before starting treatment with this medicine. Taking this medicine may impair alertness; therefore, caution must be exercised when engaging in activities such as driving, operating dangerous machinery, and other activities that require alertness.

DRUG INTERACTIONS: If you are taking any additional drugs or if you have just finished a course with another medicine, inform the attending physician in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions, especially when the concomitant drug is one of the following: CNS drugs, Antacids group, Theophylline, and Probenecid.

SIDE EFFECTS: In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course of taking this medicine. Symptoms that may occur are diarrhea, rash, nausea, dizziness, sun sensitivity, headache, agitation, and tremor. If any side effects not mentioned in this leaflet are experienced or if there has been any change in the general health, consult your physician.

RECOMMENDED DOSAGE UNLESS OTHERWISE PRESCRIBED BY YOUR PHYSICIAN: Dosage is according to physician's instructions only. Do not exceed the recommended dosage. If you forget to take this medicine at the specified time, take the dose as soon as you remember, but never take a double dose.

DIRECTIONS FOR USE: Do not chew! Swallow the medicine with an adequate amount of water. This medicine must not be taken with milk or any dairy products. Ciprocure may be taken with or without meals, but is best tolerated when taken 2 hours after meal. If there is stomach irritation, the medicine can be taken with meals.

HOW CAN YOU CONTRIBUTE TO THE SUCCESS OF THE TREATMENT? Complete the full course of treatment as instructed by the physician. Even if there is an improvement in your health do not discontinue using this medicine, before consulting your physician.

AVOID POISONING: This medicine contains substances, which can be poisonous or fatal in large doses to children and/or infants, therefore must be kept out of their reach. In case of accidental overdose, or if a child uses this medicine by accident, seek professional assistance or rush to a hospital emergency room accompanied with the medicine's package. This medicine has been prescribed for the treatment of your illness; it may harm other patients. *Do not give this medicine to your relatives, neighbours, etc.* Do not take medicine in the dark! Check the label and the dose each time you take your medicine.

STORAGE: Store in a cool and dry place. Even if kept in their original container and stored as recommended, medicine may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt consult the pharmacist who dispensed the medicine to you.

PRESENTATION:

Ciprocure® 250: Box of 10, 20 Tablets

Ciprocure® 500: Box of 10, 15 Tablets

Ciprocure® 750: Box of 10 Tablets

REGISTRATION NUMBER:

Ciprocure® 250 (10 Tablets): 007/548/10, 20

Ciprocure® 500 (10 Tablets): 007/549/10, 15

Ciprocure® 750 (10 Tablets): 007/300/10

Pharmacare PLC

Beitunia- Industrial Zone- P.O. Box 677 - Ramallah, Palestine



L-2012052717/1909/1

نشرة للمريض
ملزم بوصفة طبية
يجب قراءة النشرة جيدا قبل البدء بالاستعمال
سيبروكير® ٢٥٠، ٥٠٠، ٧٥٠ حبوب

التركيب الدوائي: تحتوي كل حبة على ٢٥٠، ٥٠٠، ٧٥٠ ملغم سيبروفلوكساسين (على شكل مونوهيدرات هايدروكلوريد).
الفعالية العلاجية: مضاد حيوي واسع الفعالية.
دواعي الاستعمال: يستعمل هذا الدواء لمعالجة الالتهابات الناتجة عن الجراثيم الحساسة للسيبروفلوكساسين.
متى لا يجوز استعمال هذا الدواء؟

للمرضى المعروف أن لديهم حساسية للمادة الفعالة.

لا يجوز استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب: إذا كنت حامل أو مرضعة، إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في الجهاز العصبي، الكبد، أو الكلى. لا يجوز استعماله لدى الأطفال.

التحذيرات: يجب قدر الإمكان تجنب العلاج الطويل الأمد والمستمر دون استشارة الطبيب. يجب إبلاغ الطبيب إذا كانت لديك حساسية لنوع معين من الأدوية أو الطعام قبل البدء في هذا العلاج. إن استعمال هذا الدواء قد يضعف اليقظة، لذا يجب التزام الحذر عند القيام بنشاطات مثل قيادة السيارة أو تشغيل آلات خطرة أو العمل في مكان يتطلب اليقظة.

التداخلات الدوائية: إذا كنت تتناول دواء إضافيا أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر فيجب إبلاغ الطبيب المعالج لتفادي الأخطار أو عدم نجاح الدواء الناجمة عن تفاعلات مع عقاقير أخرى وخاصة مع أدوية الأعصاب، مضادات الحموضة، ثيوفيلين والبروبيسييد.

الأعراض الجانبية: بالإضافة إلى التأثير الطبي للدواء فان لكل دواء تأثيرات وأعراض جانبية غير مرغوب فيها قد تحدث أثناء تناول هذا الدواء. مثال ذلك الإسهال، الطفح الجلدي، الغثيان، الدوخة، الحساسية للأشعة الشمسية، الصداع، التوتر، والرجفان. على المريض إبلاغ الطبيب في حال الشعور بأي أعراض جانبية أخرى غير واردة في هذه النشرة أو بأي تغيرات على الصحة العامة.

الجرعة الدوائية ما لم تكن هنالك إرشادات من الطبيب: الجرعة حسب إرشادات الطبيب فقط. يجب عدم تجاوز الجرعة المحددة. في حالة نسيان تناول الدواء في الوقت المناسب، يجب على المريض تناول الدواء في أقرب وقت ممكن، لكن في أي حال من الأحوال لا تتناول جرعتين معا في آن واحد.

إرشادات الاستعمال: ليس للمضغ. يتناول هذا الدواء مع كمية كافية من الماء. لا يتناول هذا الدواء مع الحليب أو منتجات الألبان. يمكن تناول سيبروكير قبل الطعام أو معه ، و لكن يفضل تناوله بعد ساعتين من تناول الطعام، إذا كانت المعدة حساسة ، فانه يمكن تناول الدواء مع الطعام .

كيف يمكنك المساهمة في إنجاح العلاج: إكمال دورة العلاج كاملا كما هو مقرر من قبل الطبيب. عدم التوقف عن تناول العلاج دون استشارة الطبيب حتى لو طرأ تحسن على الصحة.

لتجنب التسمم: يجب حفظ الأدوية في مكان بعيد عن متناول الأطفال أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. في حال تناول جرعة زائدة أو إذا قام طفل بتناول هذا الدواء بالخطأ يجب التوجه إلى الطوارئ واصطحب علبه الدواء. هذا الدواء وصف لعلاج مرضك أنت لذا فقد يسبب الضرر لمريض آخر. لا تعطي/ن هذا الدواء لجارك أو قريبك أو أي شخص آخر. لا يجوز تناول هذا الدواء في الظلام. يجب التأكد من الدواء والجرعة قبل الاستعمال.

التخزين: يجب حفظ الدواء في مكان بارد وجاف. لا تبقى الأدوية صالحة لفترات طويلة حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب الإرشادات. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر. في حالة الشك يجب استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء.

الشكل و المحتوى:

سيبروكير® ٢٥٠: علبه تحتوي على ٢٠ / ١٠ حبة.
سيبروكير® ٥٠٠: علبه تحتوي على ١٥ / ١٠ حبة.
سيبروكير® ٧٥٠: علبه تحتوي على ١٠ حبات.

رقم التسجيل:

سيبروكير® ٢٥٠: ٢٠٠، ٢٠٠، ٥٤٨/١٠٠/٠٧٠٠٧
سيبروكير® ٥٠٠: ١٠٠، ١٠٠، ٥٤٩/١٥٠/٠٧٠٠٧
سيبروكير® ٧٥٠: ١٠٠، ١٠٠، ٣٠٠/٠٧٠٠٧



شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية

بيتونيا - المنطقة الصناعية- ص.ب. ٦٧٧- رام الله - فلسطين