

Sملاز بوصفة طبية
Prescription Only Medicine**P**ملاز بوصفة طبية
Prescription Only
FOR VETERINARY USE ONLY

Composition: Each 1ml contains 300 mg Florfenicol.
Indication: Indicated in the treatment of infections caused by micro-organisms susceptible to Florfenicol.

Storage conditions:

1. Store at temperature not exceeding 25 °C away from light.
2. Keep away from reach of children.

Withdrawal time: For meat: Cattle (IM): 30 days. Cattle (SC): 44 days. Swine: 18 days.

Don't use after 28 days from opening.

Recommended dosage: - Swine: 1 ml/20 kg of body weight twice at 48 hours interval by intramuscular injection.

Cattle: Treatment: * 1 ml/15 kg of body weight twice at 48 hours interval by intramuscular injection.

* 2 ml/15 kg of body weight once by subcutaneous injection.

Prevention: 2 ml/15kg of body weight once by subcutaneous injection.

Contraindication: Animals with known hypersensitivity to active ingredient.

In cattle producing milk for human consumption.

In adult bulls or boars intended for breeding purposes.

The use of the product during pregnancy and lactation is not recommended.

Not recommended in calves to processed for veal for human consumption.

Not to be used for sheep, goats and horses.

Not to be used for cattle breeding age.

Side effects: Inappetence, decreased water consumption, and diarrhea may occur transiently following treatment.

May cause inflammatory lesion at injection site.

Drug interactions:

The drug must not be used with aminoglycosides, erythromycin, lincomycin, tylosin and penicillins.

Florocare-vet®

Injectable Solution

Florfenicol

فلوروكيـرـ فـيت®

محلول معد للحقن

فلورفينيكول 100 ml

فرع النور:

شركة دار الشفاء

Pharmacare PLC

بيتونيا - المنطقة الصناعية ص.ب. ٦٧٧ رام الله / فلسطين

Betunia-Industrial zone- P.O.Box 677 Ramallah / Palestine

التركيب الدوائي: كل 1 مل يحتوي على 300 ملغم من فلورفينيكول.
المفعالية العلاجية: لمعالجة الإصابات الناجمة عن الجراثيم الحساسة للفلورفينيكول.
ظروف التخزين:

١. يحفظ الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية بعيداً عن الضوء.
٢. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

فترة الأمان: اللحوم: الماشية (في العضل): ٣٠ يوم
 الماشية (تحت الجلد): ٤٤ يوماً. الخنازير: ١٨ يوم.
 لا تستخدم الدواء بعد ٢٨ يوم من فتح العبوة.

الجرعة الدوائية: - الخنازير: ١ مل/٢٠ كغم من وزن الجسم مرتان خلال فترة ٤٨ ساعة حفنة في العضل.

- الماشية: العلاج: ١ مل/١٥ كغم من وزن الجسم مرتان خلال فترة ٤٨ ساعة حفنة في العضل.
 ٢ مل/١٥ كغم من وزن الجسم مرة واحدة حفنة تحت الجلد.

الوقاية:
 ٢ مل/١٥ كغم من وزن الجسم مرة واحدة حفنة تحت الجلد.
موانع الاستخدام: الحيوانات المعروفة أن لديها حساسية للمادة الفعالة.

في الأبقار المنتجة للحليب للاستهلاك البشري.
 في كبار الثيران أو الخنازير المعدة لغرض التكاثر.

لا ينصح استخدام المنتج خلال فترة الحمل والرضاعة.
 لا ينصح استخدامه في العجول المعدة لانتاج اللحوم للاستهلاك البشري.
 لا تستخدم في الأغنام والماض والخيول.

لا تستخدم في الماشية في من التكاثر.
الأعراض الجانبية: فقدان الشهية، وانخفاض استهلاك المياه، والإسهال قد يحصل بشكل عابر بعد العلاج.

قد يسبب نقرح التهابي في موقع الحقن.
التدخلات الدوائية:

الدواء يجب عدم استخدامه مع الأمينو غلوكوزيد، الاريثروميسين،
 الينوكمايسين، التايالوسين والبنسلين.

Reg. No. 7177

Batch No. :

Exp. :