

Composition: Each 1 ml contains 100 mg Levamisole (118 mg Levamisole HCl)

Indication: Anthelmintic.

Storage conditions: 1. Store below 25°C, in a dry place away from sunlight.

2. Keep away from reach of children.

Contraindications: Hypersensitivity to levamisole HCl. -Administration within 14 days of treatment with organophosphorous compound or diethylcarbamazine citrate.

Warning: - It should be used cautiously if your pets have significant renal or hepatic impairment.

- Should not be used in cattle and sheep producing milk for human consumption.

Drug interaction:

Pyrantel, diethylcarbamazine, and organophosphate drugs may enhance the toxic effects of levamisole.

Side effects: Frothing at the mouth, death, as well as alopecia and exfoliation of the skin, transient coughing.

Withdrawal time:

Meat: 28days. Milk and eggs :3 days.

Recommended dosage: Orally administration.

Poultry: 0.2 ml / kg B.W and repeat the same dose after 21 days.

Cows, Sheep and Goats: 1.5 ml /20 kg B.W and repeat the same dose after 14 days.

This product is valid for 3 months after opening of the bottle.

Levavet 10% Solution®

Oral Solution



500 ml

محلول ليفافيت ١٠٪

محلول عن طريق الفم

Pharmacare PLC AL-NUP شركة دار الشفاء

بيوتها - المنطقة الصناعية من ب ٦٧٧ رام الله فلسطين

Betunia - Industrial Zone P.O.Box 677 Ramallah/ Palestine

التكوين الدوائي: كل ١ مل يحتوي على ١٠٠ ملغم ليفاميزول (١١٨ ملغم هيدروكلوريد الليفاميزول).

الفعالية العلاجية: طارد للديدان.

ظروف التخزين: ١- يحفظ الدواء في درجة حرارة أقل من ٢٥

درجة مئوية، في مكان جاف وبعيداً عن الضوء.

٢- يحفظ بعيداً عن تناول الأطفال.

موانع الاستخدام:- فرط الحساسية لهيدروكلوريد الليفاميزول.

- يؤخذ خلال ١٤ يوماً من العلاج بالمركبات الفسفورية العضوية

أو سترات ثنائي إيثيل كاربامازين.

تحذيرات: - يجب استعمال هذا الدواء بحذر عند الحيوانات التي

تعاني من خلل في وظيفة الكبد أو الكلية. - يجب عدم استعمال هذا

الدواء في الأبقار والأغنام المنتجة للحليب للاستهلاك البشري.

التداخلات الدوائية:- بارينتل، دايتلكاربامازين

وأورجانوفوسفات قد تحفز السمية الناتجة من الليفاميزول.

الأعراض الجانبية: رغبة في الفم، الوفاة، صلح، وتقشر الجلد

وسعال عابر.

فترة الأمان:- اللحوم: ٢٨ يوم. - الحليب والبيض: ٣ أيام.

الجرعة الدوائية: يؤخذ عن طريق الفم.

الدواجن: ٠,٢ مل / كغم من وزن الجسم وتعاد نفس الجرعة بعد

٢١ يوم.

الأبقار والخراف والماعز: ١,٥ مل / ٢٠ كغم من وزن الجسم

وتعاد نفس الجرعة بعد ١٤ يوم.

يبقى الدواء صالحاً للاستعمال بعد ٣ أشهر من فتح العبوة.

S

ملزم بوصفة طبية
Prescription Only Medicine

P

FOR VETERINARY USE ONLY
للاستعمال البيطري فقط

Batch No. :

Exp. :