

6
9251595
510052

Batch No.:

Exp.:

Composition:

Each 1 g powder contains 5000000 IU Colistin sulfate).

Indication: Indicated in the treatment of infections caused by microorganisms susceptible to Clostelin.

Storage Conditions: 1. Store below 30°C, in a dry place away from sunlight. 2. Keep away from reach of children.

Drug Interactions: Do not use in combination with aureomycin and terramycin. - Colinur-Vet may cause hypersensitivity reactions.

Warning: - You should use this product within 24 hours after dissolving the powder in water.

- Discontinue treatment 7 days prior to slaughter.

- Severe sick animals have to be medicated parenterally.

Withdrawal time: Meat: 7 days, eggs: 7 days.

Recommended dosage: For oral administration through the drinking water or artificial milk. Calves: 1g per 80 kg bodyweight, twice daily, during 5-7 consecutive days. Pigs: 250 g / 1000 litres of drinking water daily, during 5-7 consecutive days. Poultry: 100-200 g / 1000 litres of drinking water daily, during 5-7 consecutive days.

When used for acute enteritis, rate of use shall be twice the maximum limit of the dose above.

Contraindications:

- To ruminants animals with an active microbiological digestion.
- In animals hypersensitive to colistine sulfate.
- In animals suffered from impaired renal failure.
- In pregnant and breast feeding animals.
- Don't use the medicine after one month of opening.

Reg. No.: 7410

Colinur-Vet® Powder soluble in water

كولينور-فيت®
بودرة للذوبان في الماء

100 g



بيتونيا - المنطقة الصناعية ص.ب. ٦٧٧ رام الله / فلسطين
Betunia- Industrial Zone P.O.Box 677 Ramallah / Palestine

N2013035852/5241



التركيب الدوائي: كل 1 غرام يحتوى على 5000000 وحدة دولية كوليستين سلفات.
الفعالية العلاجية: يستخدم لعلاج الالتهابات التي تسببها الجراثيم الحساسة للكوليستين.
ظروف التخزين: ١- يحفظ الدواء في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية، في مكان جاف و بعيداً عن الضوء. ٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
تفاعلات الأدوية: لا يستخدم الدواء مع الأوريومايسين و تيرمايسين.
كوليور - فيت يمكن أن يسبب حساسية.
تحذيرات: بعد التحضير يبقى الدواء صالح للاستعمال لمدة ٢٤ ساعة
يجب وقف العلاج ٧ أيام قبل الذبح. الحيوانات شديدة المرض يجب معالجتها بالحقن
فترة الأمان: اللحوم: ٧ أيام البيض: ٧ أيام.
الجرعة الدوائية: عن طريق الفم من خلال مياه الشرب أو الحليب الاصطناعي.

العجل: ١ غم / ٨٠ كغم من وزن الجسم مررتين يومياً لمدة ٧-٥ أيام متتالية.
الخنازير: ٢٥٠ غم / ١٠٠٠ لتر من مياه الشرب يومياً، خلال ٧-٥ أيام متتالية.
الدواجن: ١٠٠ - ٢٠٠ / ١٠٠٠ لتر من مياه الشرب يومياً، خلال ٧-٥ أيام متتالية
عندما تستخدم لمرض الامعاء الحادة ، ويجب أن يكون معدل الجرعة مررتين الحد
الأقصى من الجرعة المذكورة أعلاه.
موانع الاستخدام: لا يعطى للحيوانات المجترة ذات الهضم الميكروبولوجي النشط.

لا يعطى للحيوانات الحساسة للكوليستين سلفات.
في الحالات التي تعاني من قصور في عمل الكلى.
لا يستخدم في حالة الحمل والرضاعة.
لا يستخدم المستحضر بعد شهر من فتح العبوة.