

Patient Package Insert
Prescription Only Medicine
Carefully read the entire leaflet before starting use
GLUCOCARE® TABLET

COMPOSITION: Each tablet contains 5 mg Glibenclamide.

THERAPEUTIC ACTIVITY: Oral hypoglycemic agent.

APPROVED INDICATIONS: It is indicated for the treatment of non-Insulin dependent diabetes mellitus (TYPE 2).

WHEN SHOULD THE PREPARATION NOT BE USED?

In patients with known hypersensitivity to the active ingredient.

DO NOT USE THIS MEDICINE WITHOUT CONSULTING A PHYSICIAN: Do not take this drug if you are diabetic type I or in case of ketoacidose with or without coma. If you are pregnant or breastfeeding. If you are suffering or have suffered in the past from impaired function of the heart, kidney, and / or vascular system.

WARNINGS: If you are allergic to any type of food or medicine, inform your physician before commencing treatment with this medicine. This medicine may cause hypersensitivity when exposed to sunlight. Therefore, avoid exposure to sunlight. Do not drink alcohol while taking Glucocare. Blood and urine glucose should be monitored periodically

DRUG INTERACTIONS: If you are taking any additional drugs or if you have just finished a course with another medicine, inform the attending physician, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions, especially with medicines belonging to the following: Salicylates group, sulfonamides group, chloramphenicol, non-steroid anti-inflammatory drugs, probenecid, coumarins, and beta-adrenergic blocking agents.

SIDE EFFECTS: In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course of taking this medicine. Major side effects are hypoglycemia, sweating, blurred vision, and skin hypersensitivity. If any side effects not mentioned in this leaflet are experienced or if there has been any change in the general health, consult your physician.

RECOMMENDED DOSAGE: Dosage is according to physician's instructions only . Do not exceed the recommended dosage. This medicine is to be taken at specific time intervals as determined by the physician.

DIRECTIONS FOR USE: Do not chew the tablet! Swallow the tablet with a small amount of water. It is recommended that the daily dose can be taken before one half an hour of a substantial breakfast or before the first main meal.

HOW CAN YOU CONTRIBUTE TO THE SUCCESS OF THE TREATMENT? Complete the full course of treatment as instructed by the physician. Even if there is an improvement in your health do not discontinue using this medicine, before consulting your physician.

AVOID POISONING: This medicine contains substances, which can be poisonous or fatal in large doses to children and/or infants, therefore must be kept out of their reach. This medicine has been prescribed for the treatment of your illness; it may harm other patients. Do not give this medicine to your relatives, neighbours, or anybody else. Do not take medicine in the dark! Check the label and the dose each time you take your medicine. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt consult the pharmacist who dispensed the medicine to you.

OVERDOSE: In case of accidental overdose or if a child takes this medicine by accident, seek professional assistance or rush to a hospital emergency room accompanied with the medicine's package. Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor!

The overdosage symptoms of glibenclamide include: Hypoglycemic symptoms (like Low body temperature, dizziness, headache, confusion, blurred vision). Or Severe hypoglycemic symptoms (like convulsions, coma).

MISSED DOSE: If you forget to take this medicine at the specified time, take the dose as soon as you remember. If it is closed to your next dose do not take the missed dose, just take the next dose at regular time, but never take a double dose. If you have missed several doses, inform your doctor immediately.

STORAGE: Store in a cool and dry place. Even if kept in their original container and stored as recommended, medicine may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt consult the pharmacist who dispensed the medicine to you.

PRESENTATION: Box of 30 and 100 Tablets

REGISTRATION NUMBER: 007/523/30-100

Pharmacare PLC
Beitunia Industrial Zone- P.O. Box 677 - Ramallah, Palestine



L-2013092954/2549/1

نشرة للمريض
ملزم بوصفة طبية
يجب قراءة النشرة جيدا قبل البدء بالاستعمال
جلوكوكير® حبوب

التركيب الدوائي: تحتوي كل حبة على ٥ ملغم جليبنكلاميد.

الفعالية العلاجية: خافض للسكر في الدم.

دواعي الاستعمال: لمعالجة مرض السكري من النوع غير المعتمد على الأنسولين (نوع ٢).

متى لا يجوز استعمال هذا الدواء؟

للمرضى المعروف أن لديهم حساسية للمادة الفعالة.

لا يجوز استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب: في حالة الحمل أو الرضاعة. للمرضى الذين يعانون في الوقت الحالي أو مسبقا من أمراض في القلب، الكلى أو الشرايين. لا يجوز وصف هذا الدواء لمرضى السكري نوع ١ أو في حالات كيتواسيدوسيس مع أو بدون وجود سبات.

التحذيرات: يجب إبلاغ الطبيب قبل استعمال هذا الدواء إن تواجدت حالات الحساسية لدواء معين أو طعام ما. قد يسبب هذا الدواء حساسية مفرطة عند التعرض لأشعة الشمس لذلك يجب الامتناع عن مثل هذا التعرض. يجب الامتناع عن شرب الكحول والمشروبات الروحية أثناء العلاج بهذا الدواء. يجب مراقبة كمية السكر في الدم والبول بشكل دوري.

التداخلات الدوائية: إذا كنت تتناول عدة أدوية في نفس الوقت، أو إذا أنهيت العلاج قبل فترة وجيزة من بدء تناولك لهذا الدواء، اعلم طبيبك المعالج أو الصيدلاني وذلك لمنع التفاعلات الجانبية أو عدم النجاعة الناجمة عن التفاعلات ما بين الأدوية، وهذا مهم خاصة مع الأدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية: السلسليات، السلفوناميد، الكلورامفينيكول، مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، بروبينيسيد، كومارين، ومثبطات مستقبلات البيتا.

الأعراض الجانبية: بالإضافة إلى التأثير الطبي للدواء فإن لكل دواء تأثيرات وأعراض جانبية غير مرغوب فيها قد تحدث أثناء تناول هذا الدواء. مثال ذلك هبوط السكر، التعرق، تشوش الرؤية، والحساسية على سطح الجلد. على المريض إبلاغ الطبيب في حال الشعور بأي أعراض جانبية أخرى غير واردة في النشرة أو بأي تغيرات على الصحة العامة.

الجرعة الدوائية: الجرعة حسب إرشادات الطبيب فقط. يجب تناول هذا الدواء في فترات معينة كما حددها الطبيب. يجب عدم تجاوز الجرعة المحددة.

إرشادات الاستعمال: لا تمضغ أو تعض الحبة! ابلع الحبة كاملة مع كمية كافية من الماء. ينصح بتناول الجرعة اليومية قبل الفطور بنصف ساعة أو قبل الوجبة الرئيسية بنصف ساعة.

كيف يمكنك المساهمة في إنجاح العلاج: يجب إكمال دورة العلاج كاملا كما هو مقرر من قبل الطبيب. يجب عدم التوقف عن تناول العلاج دون استشارة الطبيب حتى لو طرأ تحسن على الصحة.

لتجنب التسمم: هذا الدواء يحتوي على مواد قد تكون سامة أو قاتلة للأطفال أو الرضع على جرعات عالية، لذلك يجب حفظ الأدوية في مكان بعيد عن متناول الأطفال أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. هذا الدواء وصف لعلاج مرضك أنت لذا فقد يسبب الضرر لمرضى آخر. لا تعطي هذا الدواء لجارك أو قريبك أو أي شخص آخر. لا يجوز استخدام هذا الدواء في الظلام. يجب التأكد من الدواء و الجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر. في حالة الشك يجب استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء.

الجرعة الزائدة: في حال تناول جرعة زائدة أو إذا قام الطفل بتناول هذا الدواء بالخطأ يجب التوجه إلى الطوارئ مصطحبا معك عبوة الدواء. لا تحاول أحداث التقيؤ ما لم يتم إبلاغك بهذا من قبل الطبيب.

الجرعة المنسية: إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، تناول الدواء في حال تذكرت ذلك. إذا كان وقت الجرعة المنسية قريب جدا من وقت تناول الجرعة الدوائية، لا تتناول الجرعة المنسية بل تناول الجرعة التالية في وقتها المحدد، لكن لا يجوز مضاعفة الجرعة. إذا نسيت تناول عدة جرعات دوائية، اعلم طبيبك المعالج فورا.

التخزين: يجب حفظ الدواء في مكان بارد وجاف. لا تبقى الأدوية صالحة لفترات طويلة حتى ولو ظلت في عبوتها الأصلية وتم حفظها بموجب الإرشادات. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر. في حالة الشك يجب استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء.

الشكل والمحتوى: عبوة تحتوي على ٣٠ و ١٠٠ حبة.

رقم التسجيل: ٠٠٧/٥٢٣/٣٠٠،١٠٠



شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية
بيتونيا- المنطقة الصناعية- ص.ب. ٦٧٧- رام الله - فلسطين