



جنتانور® ه
محلول معد للحقن

Gentanur® 50
Injectable Solution

Reg.No. 7125

100 ml

N2013105953/122/1

Composition: Each 1 ml contains 50 mg of Gentamycin (as sulfate).
التركيب الدوائي: كل ١ مل يحتوي على ٥٠ ملغم من جنتاميسين (على شكل سلفيت).

Therapeutic indication: An aminoglycoside antibiotic, used to treat many types of bacterial infections, particularly those caused by Gram-negative organisms.

Storage Conditions: Store below 25°C in dry place away from light. Keep out of reach of children.

Don't use after 28 days from opening.

Withdrawal time: Meat: 28 days. Milk: 5 days.

Side effects: Nephrotoxicity, ototoxicity, neuromuscular blockade, hepatic disorders and hypersensitivity reactions.

Contraindications: Hypersensitivity to aminoglycosides, pregnant animals, renal impairment, cattle intended for food and drugs that may induce toxicity or nephrotoxicity.

Warnings: -Do not mix with any other drug for injection.

-Ensure that animals have adequate fluid and electrolyte balance during therapy.

Drug interactions: Neuromuscular blocking agents, anesthetics, penicillins, cephalosporins, loop diuretics and other aminoglycosides antibiotics.

Recommended dosage: By intramuscular (IM), slow intravenous (IV), subcutaneous (SC), or intra-uterine route:

- Cattle, sheep, goats, horses, dogs, cats, and poultry: 1 ml /10 kg b.w daily for 3-5 days.

- Poultry: Gentanur may be diluted with water for injections to make injections in young birds easier to dose.

- In mares and cows suffering from metritis can be administered intra-uterine in saline solution: 40ml/ 200ml saline administered twice with a 24 hour interval.



فرع النور:
شركة دار الشفاء
a division of Pharmacare PLC

بيتونيا - المنطقة الصناعية ص.ب. ٦٧٧ رام الله / فلسطين
Betunia-Industrial zone- P.O.Box 677 Ramallah / Palestine

Batch No. :

Exp. :

الفعالية العلاجية: مضاد حيوي من نوع أمينو غليكوزيد، يستخدم لعلاج أنواع كثيرة من الإصابات البكتيرية، وخاصة تلك التي تسببها الكائنات سالبة الجرام.
ظروف التخزين: يحفظ الدواء في درجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية في مكان جاف وبعيدا عن الضوء. يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
لا تستخدم الدواء بعد ٢٨ يوم من فتح العبوة.
فترة الأمان: اللحم: ٢٨ يوماً. الحليب: ٥ أيام.

موانع الاستخدام: الحساسية للأمينو غلايكوزيد والحيوانات الحوامل والقصور الكلوي والماشية المعدة للاستهلاك البشري والأدوية التي قد تؤدي إلى السمية أو التسمم الكلوي.

الأعراض الجانبية: تسمم كلوي وتسمم أذني وتثبيط عصبي عضلي واضطرابات في الكبد وتفاعلات حساسية.

تحذيرات: - لا تخلط مع أي دواء آخر للحقن.

- تأكد أن الحيوانات لديها توازن سوائل وأملاح كافي أثناء العلاج.

تفاعلات الأدوية: مثبطات النقل العصبي العضلي ومواد التخدير، البنسيلينات، السيفالوسبورينات، مدرات البول العروية وغيرها من المضادات الحيوية من نوع الأمينو غليكوزيد.

الجرعة الدوائية: عن طريق العضل أو الوريد بشكل بطيء أو تحت الجلد أو داخل الرحم: - الماشية والأغنام والماعز والخيول والكلاب والقطط والدواجن: ١ مل / ١٠ كغم من وزن الجسم يوميا لمدة ٣-٥ أيام.

- الدواجن: يمكن تخفيف الجنتانور مع الماء للحقن لجعل الحقن للطيور الصغيرة أسهل في الجرعة.

- الافراس والأبقار التي تعاني من التهاب الرحم يمكن ان تأخذها عن طريق داخل الرحم في محلول ملحي: ٤٠ مل / ٢٠٠ مل محلول ملحي تؤخذ على جرعتين بفواصل ٢٤ ساعة.

للإستعمال البيطري فقط
FOR VETERINARY USE ONLY

S ملازم بوصفة طبية
Prescription Only Medicine