



1 litre

VETRICINE®

N2013035850/531/1

Reg. No. 7130

Oral Solution

**Composition:** Each ml contains 13.35% Sulphadimethoxine Sodium, 2.5% Trimethoprim.

**Storage Conditions:** 1. Store at temperature not exceeding 30 °C. 2. Keep away from reach of children.

**Special Precautions:** Should not be used in animals with liver or renal disease or blood dyscrasias or in those with sulfonamide sensitivity.

**Side effect:** Hypersensitivity, vomiting, diarrhea, anorexia, polyurea.

**Drug interactions:** With antacids, par-amenobenzoic acid, local anesthetics, phenothiazines, calcium and other poly ionic containing fluid.

**Withdrawal time:** -Treatment should be discontinued 6 days prior to slaughter. - Milk: 60 hours.

**Recommended dosage:** For oral administration through the drinking water. 1-1.5 ml/liter of drinking water, for 5-7 days, or according to veterinarian instructions.

**Don't use after 28 days after opening.**

فيتريسين®

محلول للشرب عن طريق الفم

يستخدم لعلاج الإصابات الناتجة عن الجراثيم الحساسة

للترايميثوبريم والسلفاداييمثوكسين صوديوم .

يستعمل لعلاج التهاب الرئة والكلبي و الامعاء عند البقر و الاغنام

Indicated in the treatment of infections caused by microorganisms susceptible to Trimethoprim and Sulphadimethoxine Sodium.

Used to treat inflammation of the lung, kidney and intestine in cows and sheep

من المهم لكل الحيوانات المعالجة ان تتلقى كمية كافية من المياه.

**It's important that all treated animals receive adequate water intake.**

التركيب الدوائي:

كل ١ مل يحتوي على ١٣,٣٥٪ سلفاداييمثوكسين الصوديوم، ٢,٥٪ ترايميثوبريم.

ظروف التخزين:

١- يحفظ الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز ٣٠ درجة مئوية. ٢- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

تحذيرات خاصة:

لا يجب استخدام الدواء للحيوانات المصابة بمرض الكبد أو الكلى أو اضطرابات الدم أو للحيوانات المعروفة أن لديها حساسية من السلفوناميد.

الأثار الجانبية:

فرط الحساسية، والتقيؤ والاسهال وفقدان الشهية، تكرار التبول.

التداخلات الدوائية:

مع مضادات الحموضة، حمض البارا امينوبنزويك، وأدوية التخدير الموضعي، الفينوثيازين والكالسيوم وغيرها من السوائل البولي أيونية الأخرى.

فترة الأمان:

- يجب وقف العلاج قبل ٦ أيام من الذبح.  
- الحليب: ٦٠ ساعة.

الجرعة الدوائية:

يؤخذ عن طريق الفم مع مياه الشرب.  
١-١,٥ مل/لتر من مياه الشرب، أو حسب تعليمات البيطري.

لا تستخدم الدواء بعد ٢٨ يوم من فتح العبوة.

Batch No. :

Exp. :

فرع النور:

شركة دار الشفاء

AL-NUR  
a division of Pharmacare PLC

بيتونيا - المنطقة الصناعية ص.ب. ٦٧٧ رام الله / فلسطين

Betunia - Industrial Zone P.O.Box 677 Ramallah/ Palestine

P ملزم بوصفة طبية  
Prescription Only Medicine S

للإستعمال البيطري فقط  
FOR VETERINARY USE ONLY