

S

مزم بوصفة طبية
Prescription Only Medicine

P

Composition: Each 1 ml contains 25 mg Febantel.

Indications :- Anthelmintic.

- For the treatment of large and small strongyles, ascarids and pinworms in horses.
- Cattle and sheep: in the treatment of gastro-intestinal roundworms, lungworms, tapeworms, and nematode eggs.

Contraindications:

- Should not be used during pregnancy.
- Should not be used in sheep producing milk for human consumption.

Storage Conditions:

1. Store at temperature not exceeding 25 °C away from light.
2. Keep away from reach of children.

Don't use after 28 days from opening.

Shake well before use.

Special Precautions:

Intensive use or misuse of anthelmintics can give rise to resistance. To reduce the risk dosing programs should be discussed with veterinarian.

Withdrawal time:

- Meat (Cattle): 35 days.
- Meat (Sheep): 14 days.
- Cow milk: 7 days from the last treatment.

Recommended dosage and

administration: For oral administration
Cattle: 7.5 mg / Kg body weight (0.3 ml/kg)
Sheep: 5.0 mg/ Kg body weight (0.2 ml/kg)

Repeat treatment after 2 weeks.

Febacide®

Oral Suspension

فيباسيد®

معلق للشرب عن طريق الفم



Anthelmintic

طارد للديدان

فرع النور:

شركة دار الشفاء



a division of

Pharmacare PLC

بيتونيا - المنطقة الصناعية ص.ب. 677 رام الله / فلسطين
Betunia-Industrial zone- P.O.Box 677 Ramallah / Palestine

التركيب الدوائي: كل ١ مل يحتوي على ٢٥ ملغم فيبانتيل.

دواعي الاستخدام :

طارد للديدان. يستخدم لعلاج الديدان الاسطوانية الكبيرة والصغيرة، والإسكارس و الديدان الديوسية عند الخيول.
الابقار والأغنام: يستخدم لعلاج الديدان المعدية والمعوية المستديرة، الديدان الرئوية، الديدان الشريطية وبيوض الديدان المستديرة.

موانع الاستخدام:

- لا يجب استخدام المستحضر خلال فترة الحمل.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء للأغنام التي تنتج حليب للاستهلاك البشري.

ظروف التخزين:

- ١- يحفظ الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز ٢٥ درجة مئوية بعيدا عن الضوء
 - ٢- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- لا تستخدم الدواء بعد ٢٨ يوم من فتح العبوة.
خض العبوة جيدا قبل الاستعمال.

تحذيرات خاصة:

الاستخدام المكثف أو إساءة استعمال طاردات الديدان يمكن أن تؤدي إلى المقاومة. يجب مناقشة برامج الجرعات مع الطبيب البيطري للحد من خطر الجرعات.

فترة الأمان:


- لحوم (الابقار): ٣٥ يوم.
- لحوم (الأغنام): ١٤ يوم
- حليب البقر: ٧ أيام من آخر جرعة.

الجرعة الدوائية وطريقة الاستخدام: يؤخذ عن طريق الفم
الابقار: ٧,٥ ملغم/ كغم من وزن الجسم (٠,٣ مل/كغم)
الأغنام: ٥ ملغم/ كغم من وزن الجسم. (٠,٢ مل/كغم)
يجب تكرار العلاج بعد أسبوعين.

Reg. 7129

Batch No. :

Exp. :



FOR VETERINARY USE ONLY
للاستعمال البيطري فقط