



Batch No.:
Exp.:
Reg. No. 7198

Composition: Each 1 g contains 100 mg Doxycycline Hcl.

Indication: Gastrointestinal and respiratory infections caused by doxycycline sensitive micro-organisms in Pre-ruminant calves, lambs, kids, poultry and swine.

Storage Conditions: 1- Store at temperature not exceeding 25 °C in a dry place away from light. 2- Keep away from reach of children.

Withdrawal time: For meat: Pre-ruminant calves, lambs & kids: 14 days. Swine: 8 days. Poultry: 7 days. For eggs: 21 days.

Recommended dosage: For oral administration through the drinking water.

Pre-ruminant calves, lambs & kids: 50 mg (of Doxicare-vet powder) / kg body weight twice daily during 3 - 5 days. Swine & Poultry: 1 g (of Doxicare-vet powder) / 1-2 liters of drinking water during 3 - 5 days.

Contraindications: - In animals with known hypersensitivity to Tetracycline.

- In Pregnant or Growing animals. - In animals with impaired renal and /or liver function. -In ruminants with an active microbial digestion. - Lactating animals.

- laying hens which produce eggs for human consumption.

Side effects: Diarrhea, vomiting, lack of appetite, allergic reaction, photosensitivity reaction and discoloration of teeth in young animals.

Drug interactions: Drugs or food that contain aluminum, calcium, zinc, magnesium, or iron, theophylline, digoxin, penicillins, cephalosporins, aminoglycosides, quinolones, cycloserine, laxatives, kaolin, pectin and bismuth.

- Don't use after 28 days from opening.

- Don't use after 24 hours after dissolving in water.

Doxicare-Vet® 10%

Water soluble powder

100 g

التركيب الدوائي: كل ١ غرام يحتوي على ١٠٠ ملغم دوكسيسايكلين هيدروكلورايد.

الفعالية العلاجية: اصوات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسى الناتجة عن الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للدوكسسايكلين في العجل الصغيرة والحمل والجدي والدواجن والخنازير.

ظروف التخزين: ١- يحفظ الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز ٢٥ درجة مئوية في مكان جاف و بعيداً عن الضوء. ٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

فترة الأمان: للحوم: العجل الصغيرة والحمل والجدي: ٤ أيام. الخنازير: ٨ أيام. الدواجن: ٧ أيام. للبيض: ٢١ يوم.

الجرعة الدوائية: عن طريق الفم من خلال مياه الشرب.

العجل الصغيرة والحمل والجدي: ٥٠ ملغرام (من دوكسيكير- فيت بودرة) / كغم من وزن الجسم مرتان يومياً لمدة ٥-٣ أيام.

الخنازير والدواجن: ١ غرام (من دوكسيكير- فيت بودرة) / ١ لتر من مياه الشرب لمدة ٣-٥ أيام.

موانع الاستخدام: - في الحيوانات المعروفة أن لديها حساسية للتيراسيكلينات.

- في الحيوانات الحوامل أو الحيوانات في مرحلة النمو. - في الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي وأو كبدى.

- في الحيوانات المجترة ذات الهضم الميكروبى النشط. - الدجاج البياض الذي يستخدم بيضه للاستهلاك البشري.

الاعراض الجانبية: اسهال وقيء وضعف الشهية تفاعلات حساسية الضوء و تلون الاسنان عند الحيوانات الصغيرة.

التداخلات الدوائية: الأدوية او الطعام الذي يحتوى على المنيوم او كالسيوم او زنك او مغنيسيوم او حديد و الثيوفيلين والدجوكسن والبنسلينات والسلفالوسورينات والامينو غlikosidates والكوبينولونات والسيكلوسبورين والملينات والكوليцин و البكتين و البيزيميث.

- لا تستخدم الدواء بعد ٢٨ يوم من فتح العبوة. - لا تستخدم الدواء بعد ٢٤ ساعة من حله بالماء.

دوسيكير- فيت®

بودرة للذوبان في الماء

للإستعمال البيطري فقط
FOR VETERINARY USE ONLY

فرع النور:
شركة دار الشفاء
a division of Pharmacare PLC

بيتونيا - المنطقة الصناعية ص.ب. ٦٧٧ رام الله / فلسطين
Betunia- Industrial Zone P.O.Box 677 Ramallah / Palestine

P
ملزم بوصفة طبية
Prescription Only Medicine

S