

P ملزم بوصفة طبية S
Prescription Only Medicine

Reg. No.: 7185

Exp. :

Batch No. :

Composition: Each 1 ml contains 100 mg Levamisole (as Hcl).

Indication: Anthelmintic.

Storage conditions: 1- Store below 25°C, in a dry place away from sunlight.

2- Keep away from reach of children.

Contraindications: Animals with known hypersensitivity to active ingredient.

- Animals with an impaired hepatic or renal function.
- Concurrent administration of pyrantel, morantel or organo-phosphates.

Side effects: Salivation, excitation, colic, clonic spasms, sweating, coughing, hyperpnea and/or vomiting.

Don't use after 28 days of opening.

Drug interactions: Pyrantel, diethylcarbamazine, and organophosphate drugs.

Withdrawal time: Meat: 28 days. Milk: 3 days.

Recommended dosage: For intramuscular or subcutaneous administration, 1 ml /10-20 kg body weight for once.

Warning: Should not be used within 14 days of treatment with organophosphorus compounds or ethyl carbamazine citrate.

للاستعمال البيطري فقط

FOR VETERINARY USE ONLY

Levavet 10% Injection®

Injectable Solution



100 ml

ليفايت ١٠٪ حقنة®

محلول مُعد للحقن



فرع النور:
شركة دار الشفاء
a division of Pharmacare PLC
بيتونيا - المنطقة الصناعية من.ب. ٦٧٧ رام الله / فلسطين
Betunia-Industrial zone- P.O.Box 677 Ramallah / Palestine

التكوين الدوائي: كل ١ مل يحتوي على ١٠٠ ملغم ليفاميزول (على شكل هيدروكلوريد).

الفعالية العلاجية: طارد للديدان.

ظروف التخزين: ١- يحفظ الدواء في درجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية، في مكان جاف وبعيداً عن ضوء الشمس. ٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

موانع الاستخدام:

• الحيوانات المعروفة أن لديها حساسية للمادة الفعالة.

• الحيوانات التي تعاني من فشل كلوي أو كلوي.

• تناولها بالتزامن مع بارينتل أو مورانتيل أو المركبات الفسفورية العضوية.

الأعراض الجانبية: سيل اللعاب، تهيج، غصص، تشنجات ارتعاشية، تعرق، سعال، لهات و/أو تقيؤ.

لا تستخدم الدواء بعد ٢٨ يوم من فتح العبوة.

التداخلات الدوائية: بارينتل، داي إيثيل كاربامازين والأدوية الفسفورية العضوية.

فترة الأمان: اللحوم: ٢٨ يوم. الحليب: ٣ يوم.

الجرعة الدوائية: للجرعة عن طريق العضل أو تحت الجلد:

١٠-٢٠ كغم من وزن الجسم لمرة واحدة.

تحذيرات: يجب أن لا يستخدم خلال ١٤ يوماً من العلاج

بمركبات الأورجاناتو فسفورية أو الأيثيل كاربامازين سينترات.