

Letrozole Pharmacare 2.5mg film-coated tablets

Letrozole 2.5mg

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

What is in this leaflet:

1. What Letrozole Pharmacare is and what it is used for
2. What you need to know before you take Letrozole Pharmacare
3. How to take Letrozole Pharmacare
4. Possible side effects
5. How to store Letrozole Pharmacare
6. Contents of the pack and other information

1. What Letrozole Pharmacare is and what it is used for

What Letrozole Pharmacare is and how it works

Letrozole Pharmacare contains an active substance called letrozole. It belongs to a group of medicines called aromatase inhibitors. It is a hormonal (or “endocrine”) breast cancer treatment. Growth of breast cancer is frequently stimulated by oestrogens which are female sex hormones. Letrozole Pharmacare reduces the amount of oestrogen by blocking an enzyme (“aromatase”) involved in the production of oestrogens and therefore may block the growth of breast cancer that needs oestrogens to grow. As a consequence tumour cells slow or stop growing and/or spreading to other parts of the body.

What Letrozole Pharmacare is used for

Letrozole Pharmacare is used to treat breast cancer in women who have gone through menopause i.e cessation of periods. It is used to prevent breast cancer from happening again. It can be used as first treatment before breast cancer surgery in case immediate surgery is not suitable or it can be used as first treatment after breast cancer surgery or following five years treatment with tamoxifen. Letrozole Pharmacare is also used to prevent breast tumour spreading to other parts of the body in patients with advanced breast cancer. If you have any questions about how Letrozole Pharmacare works or why this medicine has been prescribed for you, ask your doctor.

2. What you need to know before you take Letrozole Pharmacare

Follow all the doctor’s instructions carefully. They may differ from the general information in this leaflet.

Do not take Letrozole Pharmacare:

- if you are allergic to letrozole or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6);
- if you still have periods, i.e. if you have not yet gone through the menopause, if you are pregnant, if you are breast-feeding.

If any of these conditions apply to you, do not take this medicine and talk to your doctor.

Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist before taking Letrozole Pharmacare

- If you have a severe kidney disease
- If you have severe liver disease
- If you have a history of osteoporosis or bone fractures (see also “Follow-up during Letrozole Pharmacare treatment” section 3)

If any of these conditions apply to you, tell your doctor. Your doctor will take this into account during your treatment with Letrozole Pharmacare.

Children and adolescents (below 18 years): Children and adolescents should not use this medicine.

Older people (age 65 years and over): People aged 65 years and over can use this medicine at the same dose as for other adults.

Other medicines and Letrozole Pharmacare: Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

Pregnancy, breast-feeding and fertility: You should only take Letrozole Pharmacare when you have gone through the menopause. However, your doctor should discuss with you about using effective contraceptive, as you may still have the potential to become pregnant during treatment with Letrozole Pharmacare. You must not take Letrozole Pharmacare if you are pregnant or breast feeding as it may harm your baby.

Driving and using machines: If you feel dizzy, tired, drowsy or generally unwell, do not drive or operate any tools or machines until you feel normal again.

Letrozole Pharmacare contains lactose (milk sugar): If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicine.

3. How to take Letrozole Pharmacare

Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure. The recommended dose is one tablet of Letrozole Pharmacare to be taken once a day. Taking Letrozole Pharmacare at the same time each day will help you remember when to take your tablet. The tablet can be taken with or without food and should be swallowed whole with a glass of water or another liquid.

How long to take Letrozole Pharmacare

Continue taking Letrozole Pharmacare every day for as long as your doctor tells you. You may need to take it for months or even years. If you have any questions about how long to keep taking Letrozole Pharmacare, talk to your doctor.

Follow-up during Letrozole Pharmacare treatment

You should only take this medicine under strict medical supervision. Your doctor will regularly monitor your condition to check whether the treatment is having the right effect.

Letrozole Pharmacare may cause thinning or wasting of your bones (osteoporosis) due to the reduction of oestrogens in your body. Your doctor may decide to measure your bone density (a way of monitoring for osteoporosis) before, during and after treatment.

If you take more Letrozole Pharmacare than you should

If you have taken too much Letrozole Pharmacare, or if someone else accidentally takes your tablets, contact a doctor or hospital for advice immediately. Take the pack of tablets with you. Medical treatment may be necessary.

If you forget to take Letrozole Pharmacare

If it is almost time for the next dose (e.g. within 2 or 3 hours), skip the dose you missed and take your next dose when you are meant to. Otherwise, take the dose as soon as you remember, and then take the next tablet as you would normally.

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose

If you stop taking Letrozole Pharmacare

Do not stop taking Letrozole Pharmacare unless your doctor tells you to. See also the section above “How long to take Letrozole Pharmacare”

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Most of the side effects are mild to moderate and will generally disappear after a few days to a few weeks of treatment. Some of these side effects, such as hot flushes, hair loss or vaginal bleeding, may be due to the lack of oestrogens in your body. Do not be alarmed by this list of possible side effects. You may not experience any of them.

Some side effects could be serious:

Rare or uncommon side effects (i.e. they may affect between 1 to 100 in every 10,000 patients):

- Weakness, paralysis or loss of feeling in any part of the body (particularly arms or legs), loss of coordination, nausea, or difficulty speaking or breathing (sign of a brain disorder, e.g. stroke).
- Sudden oppressive chest pain (sign of a heart disorder).
- Difficulty breathing, chest pain, fainting, rapid heart rate, bluish skin discoloration, or sudden arm, leg or foot pain (signs that a blood clot may have formed).
- Swelling or redness along a vein which is extremely tender and possibly painful when touched.
- Severe fever, chills or mouth ulcers due to infections (lack of white blood cells).
- Severe persistent blurred vision

If any of the above occurs, tell your doctor straight away.

You should also inform the doctor straight away if you experience any of the following symptoms during treatment with Letrozole Pharmacare:

- Swelling mainly of the face and throat (signs of allergic reaction).
- Yellow skin and eyes, nausea, loss of appetite, dark-coloured urine (signs of hepatitis).
- Rash, red skin, blistering of the lips, eyes or mouth, skin peeling, fever (signs of skin disorder).

If any of these affects you severely, tell your doctor.

Some side effects are very common. These side effects may affect more than 10 in every 100 patients.

- Hot flushes
- Increased level of cholesterol (hypercholesterolaemia)
- Fatigue
- Increased sweating
- Pain in bones and joints (arthralgia)

If any of these affects you severely, tell your doctor.

Some side effects are common. These side effects may affect between 1 to 10 in every 100 patients.

- Skin rash
- Headache
- Dizziness
- Generally feeling unwell
- Gastrointestinal disorders such as nausea, vomiting, indigestion, constipation and diarrhoea
- Increase in or loss of appetite
- Pain in muscles
- Thinning or wasting of your bones (osteoporosis), leading to bone fractures in some cases (see also “Follow-up during Letrozole Pharmacare treatment” in section 3)
- Swelling of arms, hands, feet, ankles (oedema)
- Depression
- Weight increase
- Hair loss
- Raised blood pressure (hypertension)
- Abdominal pain
- Dry skin
- Vaginal bleeding

If any of these affects you severely, tell your doctor.

Other side effects are uncommon. These side effects may affect between 1 to 10 in every 1,000 patients.

- Nervous disorders such as anxiety, nervousness, irritability, dizziness, memory problems, somnolence, insomnia
- Impairment of sensation, especially that of touch
- Eye disorders such as blurred vision, eye irritation
- Palpitations, rapid heart rate
- Skin disorders such as itching (urticaria)
- Vaginal discharge or dryness
- Joint stiffness (arthritis)
- Breast pain
- Fever
- Thirst, taste disorder, dry mouth
- Dryness of mucous membranes
- Weight decrease
- Urinary tract infection, increased frequency of urination
- Cough
- Increased level of enzymes.

If any of these side effects you severely, tell your doctor.

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly via the national reporting system listed in Appendix V. By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store Letrozole Pharmacare

Do not store this medicine above 30°C.

Store in the original package in order to protect from moisture.

Do not use any pack that is damaged or shows signs of tampering.

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton after EXP. This product is valid for 24 months from the date of manufacturing. The expiry date refers to the last day of that month.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

6. Contents of the pack and other information

What Letrozole Pharmacare contains

The active substance is letrozole. Each film-coated tablet contains 2.5 mg of letrozole.

The other ingredients are: Core: lactose monohydrate, sodium carboxymethyl starch, microcrystalline cellulose 102, hypromellose 6 cps, colloidal anhydrous silica and magnesium stearate. The coating consists of: Coating: hypromellose 15 cps, macrogol 6000, titanium dioxide (E171), iron oxide yellow (E172), iron oxide red (E172) and tartrazine aluminum lake.

What Letrozole Pharmacare looks like and contents of the pack

Letrozole Pharmacare is available as film-coated tablets.

Yellow, and round film-coated tablets.

Each pack contains 10, 30 or 100 tablets.

Marketing Authorisation Holder and manufacturer

Pharmacare Premium Limited
HHF 003 Hal Far Industrial Estate
Birzebbugia BBG 3000
Malta

This leaflet was last revised in 19/5/2016

ليتروزول فارماكير ٢,٥ ملغ حبوب مغلفة (ليتروزول ٢,٥ ملغ)

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل البدء بتناولك لهذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- احتفظ بهذه النشرة لأنك قد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أية استفسارات، اسأل طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء وصف لك أنت فقط، لا تعطه لغيرك لأنه قد يؤذيهم حتى لو كانت اعراض مرضهم شبيهة بأعراض مرضك أنت.
- إذا ظهرت لديك أية أعراض جانبية أخرى تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني بما في ذلك أية أعراض جانبية أخرى غير واردة في هذه النشرة. (انظر فقرة ٤).

على ماذا تحتوي هذه النشرة:

١. ما هو ليتروزول ولماذا يستعمل؟
٢. ما هي الأمور التي تحتاج أن تعرفها قبل تناولك لليتروزول فارماكير؟
٣. كيف تتناول ليتروزول فارماكير؟
٤. الأعراض الجانبية الممكن حدوثها؟
٥. كيف يحفظ ليتروزول فارماكير؟
٦. محتوى العبوة ومعلومات أخرى.

١. ما هو ليتروزول ولماذا يستعمل؟

ما هو ليتروزول وكيف يعمل؟

ليتروزول فارماكير يحتوي على المادة الفعالة والتي تسمى ليتروزول وهي تنتمي لمجموعة الأدوية التي تسمى " مثبطات الأروماتاز ". وهو علاج هرموني (أو "الغدد الصماء") لعلاج سرطان الثدي. نمو سرطان الثدي عادة يخفز عن طريق الاستروجين والذي يعتبر هرمون جنسي أنثوي. يخفض ليتروزول فارماكير كمية هرمون الاستروجين عن طريق اعاقا أنزيم "الأروماتاز" الذي يدخل في انتاج الاستروجين ولذلك قد يعيق نمو سرطان الثدي الذي يحتاجه الاستروجين للنمو، وكنتيجة فإن خلايا الورم السرطاني تبطئ أو تتوقف عن النمو و/أو الانتشار لأجزاء أخرى من الجسم.

لماذا يستعمل ليتروزول فارماكير؟

يستعمل ليتروزول فارماكير لعلاج سرطان الثدي عند النساء اللواتي دخلن في مرحلة سن اليأس (انقطاع الدورة الشهرية). يستعمل لينع سرطان الثدي من أن يحدث ثانية، ويمكن ان يستعمل كعلاج أولي قبل التدخل الجراحي لسرطان الثدي في حال أن التدخل الجراحي غير مستحب أو ممكن استعماله كعلاج بعد التدخل الجراحي لسرطان الثدي أو يتبع بخمس سنوات من العلاج مع التاموكيفين. يستعمل ليتروزول فارماكير كذلك لإعاقا انتشار سرطان الثدي إلى أجزاء أخرى من الجسم عند المرضى الذين يعانون من مرحلة متقدمة من سرطان الثدي. إذا كانت لديك أية استفسارات حول كيفية عمل ليتروزول أو لماذا وصف لك هذا الدواء، اسأل طبيبك.

٢. ما هي الامور التي تحتاج ان تعرفها قبل تناولك لليتروزول فارماكير؟

اتبع ارشادات الطبيب بدقة اذ ممكن ان تختلف هذه الارشادات عن المعلومات العامة الموجودة في هذه النشرة.

لا تتناول ليتروزول فارماكير:

- إذا كنت تعاني من حساسية لمادة ليتروزول أو لاحد مكونات هذا الدواء (المذكورة في الفقرة ٦).
- إذا مازالت لديك الدورة الشهرية مثلا ان لم تخلي في مرحلة سن اليأس بعد.
- إذا كنت حاملا أو مرضعة.

إذا انطبقت عليك أحد النقاط المذكورة اعلاه، لا تتناولي هذا الدواء وتحدثي إلى طبيبك.

التحذيرات والاحتياطات:

- تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل تناولك ليتروزول فارماكير.
- إذا كنت تعاني من مرض كلوي حاد.
- إذا كنت تعاني من مرض كبدي حاد.
- إذا كان لديك تاريخ من هشاشة العظام أو تعرضت عظامك للكسور (انظر كذلك فقرة "المتابعة خلال العلاج بليتروزول فارماكير" فقرة رقم ٣).

إذا انطبقت عليك أحد الشروط السابقة، اخبر طبيبك ليأخذها بعين الاعتبار خلال العلاج بليتروزول الأطفال والمراهقين (الأقل من ١٨ عام من العمر): لا يجوز تناول ليتروزول فارماكير من قبل الأطفال والمراهقين.

كبار السن (٦٥ عاما من العمر وما فوق): يستطيع الاشخاص الذين تتراوح اعصارهم ٦٥ عاما وما فوق تناول هذا الدواء بنفس الجرعة الدوائية للبالغين.

أدوية أخرى وليتروزول فارماكير: اعلم طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تتناول أو تناولت قبل فترة وجيزة أو ستتناول اية أدوية أخرى.

الحمل والرضاعة والخصوبة: يجب عليك فقط تناول ليتروزول فارماكير عندما تصلين مرحلة سن اليأس، ومع ذلك يجب على طبيبك ان يتناقش معك حول استعمالك لوسيلة منع حمل فعالة لأنه قد لايزال هناك احتمال وارد بان تصبحي حاملا خلال العلاج بليتروزول فارماكير.

يجب عليك ان لا تتناولي ليتروزول فارماكير إذا كنت حامل أو مرضعة لأنه قد يؤذي طفلك.

السياقة واستخدام الماكينات: إذا شعرت بالدوار، التعب، النعاس أو إذا شعرت بشكل عام بانك لست على ما يرام، لا تقد السيارة أو تستخدم اي أدوات أو ماكينات حتى تشعر بانك تحسنت واصبحت على ما يرام.

ليتروزول فارماكير يحتوي على اللاكتوز (سكر الحليب): إذا تم اعلامك من قبل طبيبك بانك تعاني من عدم تحملك لبعض انواع السكرينات، اتصل بطبيبك قبل تناولك لهذا الدواء.

٣. كيف تتناول ليتروزول فارماكير؟

دائما تناول هذا الدواء تماما كما اخبرك طبيبك أو الصيدلاني، وراجع طبيبك أو الصيدلاني إذا لم تكن متأكدا.

- الجرعة الدوائية المقررة هي حبة واحدة يوميا من ليتروزول مرة واحدة يوميا.
- تناول حبة الدواء في نفس الوقت من كل يوم سيساعدك في تذكرتي ستتناول حبتك.
- تستطيع ان تتناول الحبة مع أو بدون طعام ويجب عليك بلع الحبة كاملة مع كمية كافية من الماء أو شرب اي سائل آخر.

كم استمر في تناول ليتروزول فارماكير؟

استمر في تناول ليتروزول فارماكير كل يوم وفقا للمدة المقررة من طبيبك. قد تحتاج لتناول هذا الدواء لاشهر أو حتى لسنوات. إذا كانت لديك اية استفسارات حول المدة التي يجب تناولك فيها لهذا الدواء، تحدث إلى طبيبك.

المتابعة خلال العلاج بليتروزول فارماكير:

يجب عليك تناول هذا الدواء فقط تحت المراقبة الطبية الصارمة. ان طبيبك هو الشخص المخول في اخذ حالتك بعين الاعتبار ليفحص ويقرر إذا كان العلاج مناسب لك وله التأثير الصحيح عليك. ليتروزول فارماكير قد يسبب ترقق أو قد يخرب عظامك (هشاشة العظام) وذلك بسبب نقص كمية الاستروجين في جسمك. قد يقرر طبيبك قياس كثافة عظامك (بنفس الطريقة التي يتم فيها مراقبة هشاشة العظام) قبل، خلال وبعد العلاج.

إذا تناولت ليتروزول فارماكير أكثر مما يجب أو إذا تناول شخص آخر حبتك بطريق الصدفة، اتصل بطبيبك أو المستشفى لطلب النصيحة فوراً. اصطحب معك عبوة الدواء. العلاج الطبي قد يكون ضروريا.

إذا نسيت تناول ليتروزول فارماكير:

إذا كان على الاغلب موعد الجرعة الثانية (مثلا خلال ساعتين أو ٣ ساعات) تخطى الجرعة المنسية وتناول الجرعة التالية كمادتك. اما غير ذلك تناول الجرعة المقررة لك حال تذكرها وتناول الحبة التالية كمادتك. لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

إذا توقفت عن تناول ليتروزول فارماكير:

لا تتوقف عن تناول ليتروزول فارماكير مالم يخبرك طبيبك بذلك. انظر الفقرة المذكورة اعلاه (كم استمر في تناول ليتروزول فارماكير).

٤. الأعراض الجانبية الممكن حدوثها؟

مثل جميع الادوية تناول هذا الدواء ممكن ان يسبب لك بعض الاعراض الجانبية والتي قد لا يصاب بها الجميع. غالبية الاعراض الجانبية تكون خفيفة الى متوسطة وعادة تختفي بعد عدة ايام إلى عدة اسابيع من العلاج. بعض هذه الاعراض مثل التوهجات الساخنة، تساقط الشعر أو النزيف المهبلي تعزى إلى نقص الاستروجين في جسمك.

لا تدع من قائمة الاعراض الجانبية الممكنة والمذكورة ادناه. قد لا تتعرض لأي منها.

بعض الاعراض الجانبية قد تكون جدية.

الاعراض الجانبية النادرة أو الغير شائعة (كالتى قد تصيب مريض واحد إلى ١٠٠ مريض ما بين ١٠٠٠٠ مريض):

- ضعف، شلل أو فقدان الشعور بأي جزء من أجزاء الجسم (خصوصا الذراعين والساقين)، فقدان السيطرة، غثيان أو صعوبة في التحدث أو التنفس (علامة لاضطراب الدماغ مثل الجلطة).
- ألم مرهق في الصدر (علامة لاضطراب القلب).
- صعوبة في التنفس، ألم في الصدر، إغماء، تسارع في ضربات القلب، تلون الجلد باللون الازرق، أو ألم مفاجئ في الذراع، الساق أو القدم (علامات تشير إلى امكانية حدوث جلطة).
- تورم أو احمرار على طول الوريد الذي يكون الما متزايد وربما مؤلم عند اللمس.
- حرارة حادة، قشعريرة أو تفرحات فموية كحصىلة الاصابة بالعدوى (نقص في كريات الدم البيضاء).
- غشاوة بصرية مستمرة وحاددة.

إذا أصبت بأي من الاعراض الجانبية المذكورة اعلاه، أعلم طبيبك على الفور.

كما يجب اعلام طبيبك على الفور إذا عانيت من أحد الاعراض الجانبية المذكورة ادناه خلال العلاج بليتروزول فارماكير:

- انتفاخ بشكل رئيسي للوجه والحنجرة (علامات التحسس).
- تلون الجلد والعينين باللون الاصفر، غثيان، فقدان الشهية، تلون البول باللون الداكن (علامات لانتهاب الكبد).
- طفح واحمرار جلدي، حويصلات على الشفتين، العينين أو الفم، تقشير البشرة، حرارة (علامات لاضطراب الجلد).
- إذا أصبت بهذه الاعراض بشكل حاد، اعلم طبيبك.
- بعض الاعراض الجانبية شائعة جدا (قد تصيب أكثر من ١٠ مريض من بين كل ١٠٠ مريض):
 - ازدياد الترقق.
 - ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.
 - ألم في العظام والمفاصل.
 - ارقاع.

إذا أصبت بهذه الاعراض بشكل حاد، اعلم طبيبك.

بعض الاعراض الجانبية الشائعة (قد تصيب ١ إلى ١٠ مريض من بين كل ١٠٠ مريض):

- طفح جلدي.
- صداع.
- دوار.
- عدم الشعور عموما بانك على ما يرام.
- اضطرابات معدية-معوية مثل غثيان، عسر هضم، امساك واسهال.
- ازدياد أو فقدان الشهية.
- ألم في العضلات.
- انتفاخ الذراعين، اليدين، القدمين، الكاحلين (وذمة).
- اكتئاب.
- إذا أصبت بهذه الاعراض بشكل حاد، اعلم طبيبك.

أعراض جانبية أخرى غير شائعة (قد تصيب ١ إلى ١٠ مريض من بين كل ١٠٠٠ مريض):

- اضطرابات عصبية مثل اللق، العصبية، ألم في الثدي.
- التهيج، الدوار، مشاكل في الذاكرة، النعاس، الارق.
- خلل في الاحساس خصوصا حاسة اللمس.
- اضطرابات في العين مثل غشاوة البصر، تيج العين.
- ازدياد في خفقان ومعدل سرعة ضربات القلب.
- اضطرابات في الجلد مثل الحكة (الشرى).
- سيلان أو جفاف مهبلي.
- صلابة في المفاصل (التهاب المفاصل).
- إذا أصبت بهذه الاعراض بشكل حاد، اعلم طبيبك.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية:

إذا تعرضت لأي من الأعراض الجانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني بما في ذلك الاعراض الجانبية الغير مذكورة في هذه النشرة، وبإبلاغك عن هذه الاعراض الجانبية يمكنك بذلك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

٥. كيف يحفظ ليتروزول فارماكير؟

لا تحفظ الدواء بدرجة حرارة تزيد على ٣٠ درجة مئوية. احفظ هذا الدواء في عبوته الأصلية لحمايته من الرطوبة. لا تستعمل اي تعبئة قد انتفت أو ظهرت أي علامات للحرارة.

احفظ هذا الدواء بعيدا عن نظر ومتناول الأطفال.

لا تستعمل هذا الدواء بعد انتهاء مدة صلاحيته الموجودة على الكرتونة الخارجية وشرط الامنيوم. هذا الدواء صالح لمدة ٢٤ شهرا من تاريخ التصنيع. ان تاريخ صلاحية الدواء تشير إلى اليوم الاخير من ذلك الشهر.

لا تتخلص من الادوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسال الصيدلاني عن كيفية التخلص من الادوية عندما لا تستعملها. بهذه الاجراءات سوف تساعد في حماية البيئة.

٦. محتوى العبوة ومعلومات أخرى.

على ماذا يحتوي ليتروزول فارماكير؟

- المادة الفعالة هي ليتروزول. كل حبة مغلفة تحتوي على ٢,٥ ملغ من ليتروزول.
- المكونات الأخرى هي: نواة الحبة: لاكتوز مونهيدريت، نشا الصوديوم الكاربوكسي ميثل، مايكروكريستالين سيلوز ١٠٢، هيرمبولز 6cps، كوليديل السيلكا الخالية من الماء، مغنيسيوم ستايرت. تغليف الحبة يتكون من: الهيرمبولز 15 cps، الماكروجول ٦٠٠٠، التايتانوم داي أوكسيد (E171)، أوكسيد الحديد الاصفر (E172)، أوكسيد الحديد الاحمر (E172)، المنيوم التارترازين.

شكل ليتروزول فارماكير ومحتويات العبوة؟

ليتروزول فارماكير متوفر على شكل حبوب مغلفة صفراء اللون ومستديرة الشكل.

كل عبوة تحتوي على ١٠، ٢٠، أو ١٠٠ حبة.

المصنّع ومالك حق التسويق:

شركة فارماكير برسيميوم، مالطا

تاريخ آخر مراجعة لهذه النشرة: ٢٠١٦/٥/١٩