

Batch No. :

Exp. :

Reg. No.: 7187

### Composition :

Each 1 ml contain 100 mg Enrofloxacin.

**Indication:** Indicated in the treatment of infections caused by micro-organisms susceptible to Enrofloxacin.

### Storage conditions:

1- Store at temperature not exceeding 25 °C away from sunlight.  
2- Keep away from reach of children.

### Withdrawal time:

Cattle (meat): 28 days. Pigs (meat): 10 days.

**Don't use after 28 days from opening.**

### Recommended dosage:

- Pigs: 0.25 ml/10 kg of body weight daily for 3 days By intramuscular injection.
- Dogs and Cats: 0.5 ml/10 kg of body weight daily for 5 days By subcutaneous injection.
- Cattle: 0.25 ml/10 kg of body weight daily for 5 days by subcutaneous injection.

للإستعمال البيطري فقط  
FOR VETERINARY USE ONLY

# ENROCARE-Vet 10% Injection

Injectable solution

انزوكير-ثيت  
محلول معد للحقن ١٠٪<sup>®</sup>

Enrofloxacin

100 ml

فرع النور:  
شركة دار الشفاء  
AL-NUR  
a division of Pharmacare PLC

بيتونيا - المنطقة الصناعية ص.ب. ٦٧٧ رام الله / فلسطين  
Betunia-Industrial zone- P.O.Box 677 Ramallah / Palestine

N2015075334/561/2

### التركيب الدوائي :

كل ١ مل يحتوي على ١٠٠ ملغم من انروفلوكساسين.  
الفعالية العلاجية: لمعالجة الإصابات الناجمة عن الجراثيم الحساسة للانروفلوكساسين.

ظروف التخزين: ١ - يحفظ الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز ٢٥ درجة مئوية بعيدا عن ضوء الشمس.

٢ - يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

فترة الأمان:

الماشية (لحم): ٢٨ أيام. الخنازير (لحم): ١٠ يوم.  
لا تستخدم الدواء بعد ٢٨ يوم من فتح العبوة.

الجرعة الدوائية:

- الخنازير: ٠,٢٥ مل/١٠ كغم من وزن الجسم لمدة ٣ أيام حقنة في العضل.

- الكلاب والقطط: ٠,٥ مل/١٠ كغم من وزن الجسم يوميا لمدة ٥ أيام حقنة تحت الجلد.

- الماشية: ٠,٢٥ مل/١٠ كغم من وزن الجسم يوميا لمدة ٥ أيام حقنة تحت الجلد.

ملزم بوصفة طبية  
Prescription Only Medicine