



A.S.K POWDER®

Water Soluble Powder

أ.س.ك بودرة

بودرة للذوبان في الماء

200 g

Composition: Each 1g contains: Amprolium hydrochloride : 200 mg, Sulfaquinoxaline Sodium: 200 mg, Vitamin K3: 2 mg.

Indication: Used as anti-coccidia in layer and hens mothers during fosterage period. It is used to treat coccidia especially when coccidia accompanied with E. coli, salmonella and staphylococcus.

Storage Conditions: 1. Store at temperature not exceeding 30 °C away from light. 2. Keep away from reach of children.

Special Precautions: - Don't use after 28 days after opening.

- Don't use after 24 hours after dissolving in water.

Withdrawal period: For meat: 10 days. For eggs: 2 days.

Contraindications:- In animals with hypersensitivity to active ingredients.

- Animals with impaired kidney function.

- In hens laying eggs for human consumption.

- Animals with Impaired liver function.

Dosage and direction for use:

For oral administration with drinking water:

Poultry: -100g for each 200 liters of drinking water daily.

-The treatment continues for 3 days then stopped for 3 days then resumed for 3 other day.

Drug interactions: Cyclosporine, warfarin, thiamine.

Side effect: Allergic reactions, arthropathy, anemia, thrombocytopenia, hepatopathy, hypothyroidism, keratoconjunctivitis sicca.

التركيب الدوائي: يحتوي كل واحد غرام على: امبروليوم هيدروكلورايد: ٢٠٠ ملغم. سلفاكينونوكسيلين صوديوم: ٢٠٠ ملغم. فيتامين ك٣: ٢ ملغم.

دوعي لاستعمال: يستخدم كمضاد للكوكسيديات عند الدجاج البياض وأمهات الدجاج خلال فترة الحضانة. يستخدم لعلاج الكوكسيديا وخاصة عندما تترافق الكوكسيديا مع اشيرييشيا كولاي والسامونيلا والمكورات العنقودية.

ظروف التخزين: ١. يحفظ الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز ٣٠ درجة مئوية بعيداً عن الضوء. ٢. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

تحذيرات خاصة: - لا تستخدم الدواء بعد ٢٨ يوم من فتح العبوة. لا تستخدم الدواء بعد ٤٤ ساعة من حله بالماء.

فترة الأمان: اللحوم: ١٠ يوم. البيض: ٢ أيام.

موانع الاستخدام: - للحيوانات المعروفة أن لديها حساسية من المواد الفعالة. - للحيوانات التي تعاني من خلل في وظيفة الكلى.

- للدجاج البياض الذي يستخدم بيضه للاستهلاك البشري.

- للحيوانات التي تعاني من خلل في وظيفة الكبد.

الجرعة وارشادات الاستخدام: عن طريق الفم مع ماء الشرب : للدواجن: - ١٠٠ غرام لكل ٢٠٠ لتر من ماء الشرب يوميا.

- يتم العلاج لمدة ٣ أيام متتالية ثم يقطع لمدة ٣ أيام؛ ومن ثم يتبع لمدة ٣ أيام أخرى.

التدخلات الدوائية: السيكلوسبيرين ، الوارفرين، الثيامين.

التآثيرات الجانبية: تفاعلات الحساسية وأ Guillain-Barré syndrome المفاصيل ووفر الدم ونقص الصفائح وأمراض الكبد وقصور الغدة الدرقية والتهاب القرنية والملتحمة الجاف.

فرع النور:



شركة دار الشفاء
a division of Pharmacare PLC

بيتونيا - المنطقة الصناعية ص.ب. ٦٧٧ رام الله / فلسطين
Betunia- Industrial Zone P.O.Box 677 Ramallah / Palestine

Reg. No. 7178

Batch No. :

Exp. :

للاستعمال البيطري فقط

P ملزم بوصفة طبية
Prescription Only Medicine

S

FOR VETERINARY USE ONLY